

З. Ф. Ключко¹, А. Ю. Матов², И. Г. Северов³

¹Украина, г. Киев, Институт зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины

²Россия, г. Санкт-Петербург, Зоологический институт РАН

³Украина, Луганская область, г. Рубежное

К фауне совок (Lepidoptera: Noctuidae s. l.) Луганской области (Украина)

Z. F. Klyuchko, A. Yu. Matov, I. G. Severov. **On the fauna of noctuids (Lepidoptera: Noctuidae s. l.) of Lugansk Area (Ukraine).**

SUMMARY. A list of the species of the noctuids (Nolidae, Erebidae, Noctuidae) of Lugansk Area of Ukraine is given on the basis of the long-term and literature data. Three species — *Eublemma amasina* (Eversmann, 1842), *Cucullia inderiensis* (Herrich-Schdffer, 1856) and *Tholera hilaris* (Staudinger, 1901) — are found in Ukraine at the first time, 37 species are found at the first time in Lugansk Area. The lists of the species of the natural reserves in Lugansk Area are include now: for Streltsovskaya Steppe — 250, for Provalskaya Steppe — 230 and for Stanichno-Lugansky Reserve — 225 species.

Луганская область расположена в бассейне среднего течения р.Северский Донец. На севере она граничит с Белгородской и Воронежской, на востоке и отчасти на юге — с Ростовской областями России, на западе — с Харьковской, на юго-западе — с Донецкой областями Украины. Вся территория Луганщины находится в степной природной зоне; особенно сильному антропогенному прессу подвергаются селитебные ландшафты. Леса, заросли кустарников и полезащитные лесонасаждения занимают около 8 % площади. Степная растительность сохранилась на заповедных территориях, отчасти по склонам оврагов и балок и в поймах рек. Пахотные земли занимают около 60 %, пастбища и выгоны — 13,5 %, занятые оврагами, песками, болотами, шахтами — 15 % площади.

По данным «Аннотированного каталога совок (Lepidoptera, Noctuidae) фауны Украины» [Ключко и др., 2001], в Луганской области было зарегистрировано 332 вида этих чешуекрылых. За прошедшие 4 года в данном регионе обнаружено еще 54 вида совок [Ключко, 2003; Ключко и др., 2004; Ключко, Плющ, 2004; Ключко, Матов, 2005; Ключко, Шешурак, в печати].

К настоящему времени нами обработан большой дополнительный материал, что позволило подготовить предлагаемый ниже список 304 видов совок. При этом список совок Луганщины дополняется еще 37, Украины — 3 видами. Остальные виды в условиях данного региона характерны для определенных биотопов, они впервые найдены в отделениях Луганского природного заповедника, а также в новых пунктах сборов. В список не включено 26 видов, являющихся повсеместными и обычными, а также 93 вида, ранее отмеченных для конкретных пунктов.

В течение 1987–2005 гг. И. Г. Северов собрал на свет и методом ручного сбора сачком более 1200 бабочек из 303 видов (Nolidae — 4, Erebidae — 38, Noctuidae — 261), преимущественно в окрестностях гг. Рубежное, Северодонецк, Кременная, Лисичанск, Славяносербск, пгт. Тошковка Первомайского района в долине р. Северский Донец (главной водной артерии Луганской области), а также на ст. Голубовка близ г. Кировск, в селах Муратово, Гречишкино, Спиваковка и Смольяниново Новоайдарского района и в других пунктах (в тексте фамилия сборщика указанных бабочек не названа, некоторые этикетки неполные, в них отсутствуют даты сбора либо указан только год).

Изучены также материалы по видовому составу совков, собранные Г. Г. Браилко, З. Ф. Ласман, З. Ф. Ключко в окрестностях г. Рубежное и г. Северодонецк, сборы Ю. И. Савкина из с. Давыдо-Никольское Краснодонского района, сборы С. В. Коновалова в с. Дьяково Антрацитовского района в 2004–2005 гг. В текст включены данные о совках, отмеченных в последние годы в отделениях Луганского природного заповедника: Станично-Луганском, Стрельцовой и Провальской степи (сборы П. Н. Шешурака, В. П. Форощука, З. Ф. Ключко, А. В. Бидзили, О. В. Пака и др., некоторые из них уже приведены в предыдущих публикациях).

Все виды, включенные в список, определены или проверены З. Ф. Ключко или А. Ю. Матовым, при необходимости — по гениталиям (что специально отмечается лишь в сложных случаях). Материалы хранятся в коллекциях Зоологического института РАН, музея Института зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины, зоологического музея Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, зоологического музея Нежинского педагогического университета, а также в частной коллекции И. Г. Северова.

Приведенный ниже аннотированный список составлен нами с учетом самой последней классификации группы и основанного на ней списка видов фауны Европы [Fibiger, Hacker, 2005], где совки разделены на несколько семейств, представители трех из которых (Nolidae, Erebidae, Noctuidae) обитают в Луганской области Украины. Виды, впервые найденные в области, обозначены звездочкой *, впервые в Украине — двумя звездочками **.

Принятые сокращения пунктов сбора: Гол.— станция Голубовка, Гр.— с. Гречишкино, Дав.-Ник.— с. Давыдо-Никольское, Д.— с. Дьяково, Кр.— Кременная, Лис.— г. Лисичанск, Луг.— г. Луганск, Мур.— с. Муратово, Н. А.— Ново-Айдар, Пров.— заповедник Провальская степь, Руб.— г. Рубежное, Сев.— г. Северодонецк, Сл.— г. Славянск, См.— с. Смольяниново, Сп.— с. Спиваковка, Стан.-Луг.— Станично-Луганский заповедник, Стр.— заповедник Стрельцовская степь, Т.— г. Торез, Тош.— пгт. Тошковка Первомайского района. В аннотациях вначале приводятся, как правило, пункты сборов И. Г. Северова, затем — других сборщиков, затем — отделения Луганского природного заповедника.

Список видов

Семейство Nolidae

1. *Nycteola asiatica* (Krulikovsky, 1904): Руб., 2 экз., 14.06.2005, в июне-июле иногда отмечался массово; Д., 1 экз., 2.09.2005 (Коновалов).
2. *Earias clorana* (Linnaeus, 1761): Руб., 1 экз., 12.07.1989; Сев., 1 экз., 12.07.1989.
3. *Earias vernana* (Fabricius, 1787): Сев., 2 экз., 12.07.1989; Пров., 1 экз., 17.07.2002; Стан.-Луг., 20 экз., 7-27.07.2002 (Шешурак), 1 экз., 4.07.2002 (Бидзиля).
4. *Bena bicolorana* (Fuessly, 1775): Руб., 1 экз., 06.1999.
5. *Pseudoips prasinanus* (Linnaeus, 1758): Пров., 1 экз., 17.07.2002 (Шешурак).

Семейство Erebidae

6. *Rivula sericealis* (Scopoli, 1763): Руб., Сев., редко, собрано 3 экз, июнь — сентябрь.
- *7. *Parascotia fuliginaria* (Linnaeus, 1761): Руб., 6 экз., 07.2001, 1 экз., 14.06.2005 (Ключко).
8. *Hypenodes humidalis* Doubleday, 1850: Стан.-Луг., 1 ♀, 7.07.2002 (Шешурак).
- *9. *Schrankia costaestrigalis* (Stephens, 1834): Руб., 1 ♂, 09.2001.
10. *Calymma communimacula* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Руб., 3 экз., 06.2004. С 1994 по 2004 гг. отмечалось по 2–3 бабочки за сезон.
11. *Eublemma minutata* (Fabricius, 1794): Руб., 2 экз., 1-5.06.2005, 1 экз., 24.07.1986, 3 экз., 5.06.1987. Бабочки летают днем, иногда летят на свет.
- *12. *Eublemma panonica* (Freyer, 1840): Руб., 1 ♂, 07.2001, 2 экз., 06.1998.
- **13. *Eublemma amasina* (Eversmann, 1842): Пров., 1 ♂, 05.1999. Описан из Оренбурга, ареал охватывает Среднее Поволжье, Южный Урал, Казахстан, Южную Сибирь, Дальний Восток, Китай, Монголию, Корею, Японию. Бабочки встречаются редко, гусеницы неизвестны. Заповедник Провальская степь представляет самое западное местонахождение.

14. *Eublemma atoenae* (Hübner, [1803]): Руб., 2 экз., 06.1998, 1 экз., 08.1999; Д., 1 экз., 22.09.2005 (Коновалов).
15. *Eublemma purpurina* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Руб., 1 экз., 1.06.2005; Д., 1 экз., 28.09.2005 (Коновалов).
- *16. *Eublemma pallidula* (Herrich-Schäffer, 1856): Руб., 1 ♂, 12.07.2001.
17. *Paracolax tristalis* (Fabricius, 1794): Руб., 2 экз., 06.2001.
18. *Polygogon strigilata* (Linnaeus, 1758): Руб., Сев., Мур., редко, май — июнь 2001.
19. *Polygogon lunalis* (Scopoli, 1763): Сев., 1 экз., 3.07.1989, 1 экз., без даты 1990.
20. *Hypena proboscidalis* (Linnaeus, 1758): Руб., 2 экз., 31.05.2001, 20.06.1989; окрестности Руб. близ р.Боровая, 1 экз., 20.05.1989; Мур., 1 экз., 2.08.1989.
21. *Phytometra viridaria* (Clerck, 1759): Руб., 1 экз., первая декада 06.2001.
22. *Colobochyla salicalis* ([Denis & Schiffermüller], 1775): окрестности Сев. близ р.Боровая, 3 экз., 20.09.1989; Сл., 1 экз., 28.05.1989.
23. *Laspeyria flexula* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Руб., 1 ♂ и 1 ♀, 07.1999, 2 экз., 9.06.2005.
24. *Calyptra thalictri* (Borkhausen, 1790): Дав.-Ник., 1 экз., 25.07.2001 (Савкин); Стан.-Луг., 5 экз., 7-13.07.2002 (Шешурак), 2 экз., 20.06.2002.
25. *Scoliopteryx libatrix* (Linnaeus, 1758): Руб., 1 экз., 24.04.1994; Сев., 1 экз., 4.04.1990; Сп., 1 экз., 07.1998; Лис., 1 экз., 07.2001.
26. *Lygephila lubrica* (Freyer, 1846): Пров., 2 экз., 21.07.2001.
27. *Lygephila viciae* (Hübner, [1822]): Стр., 1 экз., 23.07.2003; Стан.-Луг., 6 экз., 7-11.07.2002 (Шешурак).
28. *Lygephila craccae* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Руб., 5 экз., 06.2001, 1 экз., 22.07.1999.
29. *Drasteria caucasica* (Kolenati, 1846): Лис., 1 экз., 06.1998; Руб., 3 экз., 07.2001, 4 экз., 5-20.05.
30. *Drasteria cailino* (Lefebvre, 1827): Руб., 1 экз., 05.1998 г; Сев., 2 экз., 11.05.1981, 13.05.1988, бабочки активны днем, встречаются преимущественно на песчаных почвах. Найден также в г.Купянск Харьковской обл., 1 экз., 05.1992.
31. *Callistege mi* (Clerck, 1759): окрестности Сев., на песчаных почвах, 1 экз., 13.05.1988, 2 экз., 05.1989.
32. *Catephia alchymista* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Руб., 2 экз., 08.2001, 2 экз., 1.06.2005.
33. *Minucia lunaris* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Руб., 4 экз., 12-28.05.1995.
34. *Dysgonia algira* (Linnaeus, 1767): Д., 1 экз., 4.08.2005 (Коновалов).
35. *Grammodes stolidus* (Fabricius, 1775): Руб., 1 экз., 07.2001. Найден также в г.Купянск Харьковской обл., 1 экз., 6.06.1998.
36. *Catocala fulminea* (Scopoli, 1763): Руб., Сев., 06-07.1999, 07.2001, обычен.
37. *Catocala hymenaea* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Руб., 2 экз., 28.06-2.07.1998, 1 ♂, 07.2001.
38. *Catocala fraxini* (Linnaeus, 1758): Руб., 1 ♂ и 1 ♀, 10.07.1996 (Ласман) и 21.07.1995 (Браилко); окрестности Сев., 1 экз., днем 31.08.1991.
39. *Catocala nupta* (Linnaeus, 1767): Руб., 1 экз., 10.06.1997; Сев., 1 экз., 10.06.1992; Кр., лес в пойме р. Северский Донец, 1 экз., 06.2001.
40. *Catocala electa* (Vieweg, 1790): Руб., 1 ♂, 17.07.2003; Сев., 1 экз., 31.08.1973.
41. *Catocala elocata* (Esper, [1787]): Руб., 1 экз., 08.2001; Сев., 1 ♀, 31.08.1973; Д., 1 ♂, 2.08.2005 (Коновалов).
42. *Catocala puerpera* (Giorna, 1791): Руб., 1 экз., 07.2001.
43. *Catocala sponsa* (Linnaeus, 1767): Руб., днем массово, собрано 5 экз., 10-15.07.1996, 17.07.2004. В Кременском лесничестве близ оз.Линево массово встречалась днем 25-27.07.1996. Бабочки питались вытекающим соком на тополях между 10-17 ч. В последующие годы, вплоть до 2003, бабочки отмечены в большом количестве.
44. *Eutelina adalatrix* (Hübner, [1813]): Сев., 1 экз., 8.08.2001; Д., 1 ♂, 12.08.2004 (Коновалов).

Семейство Noctuidae

45. *Abrostola tripartita* (Hufnagel, 1766): Руб., 2 экз., 06.2001; Сев., 2 экз., 4.06.1989.
46. *Abrostola triplasia* (Linnaeus, 1758): Руб., 1 ♀ и 3 ♂♂, 06.2001, 1 ♂, 07.1997; Тош., 1 ♂, 09.2002; Д., 2 ♂♂, 11.05.2005, 7.08.2005 (Коновалов).

47. *Trichoplusia ni* (Hübner, [1803]): Руб., 2 экз., 06.2001.
48. *Euchalcia consona* (Fabricius, 1787): Руб., 1 экз., 06.1997.
49. *Panchrysia aurea* (Hübner, [1803]): Руб., 1 ♂, 25.06.1999.
50. *Lamprotes c-aureum* (Knoch, 1781): Стан.-Луг., 1 экз., 7.07.2002; Пров., 1 экз., 17.07.2002 (Шешурак).
51. *Plusia festucae* (Linnaeus, 1758): Руб., 2 экз., 1-11.06.2005, 8 экз., 07.2001, 1 экз., 07.2003; Пров., 1 экз., 14.06.2001. Впервые найден в названном заповеднике.
52. *Plusia putnami* (Grote, 1873): Руб., 1 ♀, 07.2001; Дав.-Ник., 1 экз., 20.06.2001 (Савкин).
53. *Phyllophyla obliterated* (Rambur, 1833): Руб., 2 экз., 06-07.2001; Сев., 1 экз., 06.1991.
54. *Protodeltote pygarga* (Hufnagel, 1766): Руб., 1 экз., 06.2001; Сев., 1 экз., 06.1991.
55. *Deltote uncula* (Clerck, 1759): Сев., 1 экз., 08.1989.
56. *Deltote bankiana* (Fabricius, 1775): Мур., 1 экз., 2.06.1989; Руб., 1 экз., 26.05.1988; Сев., 1 экз., 06.1990.
57. *Acontia titania* (Esper, [1798]): Стан.-Луг., 1 ♂, 9.05.2005.
58. *Colocasia coryli* (Linnaeus, 1758): Руб., 4 экз., 6.07.2001.
59. *Oxicesta geographica* (Fabricius, 1787): Сев., 2 экз., 24.07.1989; Д., 2 экз., 14-17.08.2005 (Коновалов).
60. *Moma alpium* (Osbeck, 1778): Руб., 1 экз., 25.06.1995, 2 экз., 27.06.1986.
- *61. *Acronicta cuspsis* (Hübner, [1813]): Руб., 1 экз., без даты.
62. *Acronicta aceris* (Linnaeus, 1758): Сев., 2 экз., 12-27.06.1989.
63. *Acronicta leporina* (Linnaeus, 1758): Руб., 1 экз., 11.06.1998, 1 экз., 28.08.2001, 1 экз., 08.2002.
64. *Acronicta strigosa* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Дав.-Ник., 2 экз., 21.05.2002 (Савкин).
65. *Acronicta auricoma* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Д., 1 экз., 1.05.2004 (Коновалов).
66. *Craniophora ligustri* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Руб., 1 экз.(меланист), 06.1999; Д., 1 ♂, 13.09.2005 (Коновалов).
67. *Craniophora pontica* (Staudinger, 1879): Руб., 1 экз., 23.08.2001. Второе местонахождение вида в Луганской обл., ранее был известен из Пров. [Ключко и др., 2001].
68. *Simyra nervosa* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Руб., 1 экз., 8.05.2003; Сев., 1 экз., 29.06.1986; См., 2 экз., 05.2001.
- *69. *Araustis rupicola* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Дав.-Ник., 1 ♀ и 2 ♂♂, 19.06.1999; Пров., 1 ♂, 06.2001. Восточносредиземноморский вид, впервые обнаружен в Луганской обл. и в названном заповеднике. Ранее был известен из Крыма, Донецкой, Запорожской и Николаевской обл. Украины, Добруджи в Румынии [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002; Rakosy et al., 2003].
70. *Aegle kaekeritziana* (Hübner, [1799]): Руб., 1 экз., 18.06.1998, 1 экз., 7.07.2001.
71. *Myceroplus puniceago* (Boisduval, 1840): Д., 1 экз., 9.08.2005 (Коновалов); Луг., 4 экз., 28.07.1974, 1 экз., 1.09.2002; Дав.-Ник., 3 экз., 07.1999 (Савкин).
72. *Cucullia argentina* (Fabricius, 1787): окрестности Руб., 3 экз., 7.06.1996, 20.06.1997, 07.2001; окрестности Сев., 1 экз., 2.06.1997.
73. *Cucullia magnifica* Freyer, 1840: окрестности Руб., 1 ♂, 16.08.2001.
74. *Cucullia scopariae* Dorfmeister, 1853: Руб., 1 экз., 07.2001, 2 ♂♂, 08.2003. До сих пор был известен из Пров. [Ключко и др., 2001].
75. *Cucullia fraudatrix* Eversmann, 1837: Сев., 1 экз., 13.07.1990; Руб., 1 экз., 08.1998; Стр., 1 экз., 22.07.2002; Стан.-Луг., 4 экз., 13.07.2002 (Шешурак).
76. *Cucullia absinthii* (Linnaeus, 1761): Руб., 1 ♂, 2 ♀♀, 06.2001 (опр. Ключко).
77. *Cucullia lactucae* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Руб., 2 экз., 06.1997; Дав.-Ник., 5 экз., 21-28.06.2001 (Савкин); Пров., 1 экз., 06.1999, 1 ♂, 22.07.2001 (Пак). Впервые найден в названном заповеднике.
78. *Cucullia fraterna* Butler, 1878: Дав.-Ник., 1 ♂, 11.07.2001 (Савкин)(опр. Матов); Руб., 1 ♂, 1 ♀, 06.1997 (опр. Ключко).
79. *Cucullia umbratica* (Linnaeus, 1758): Руб., 1 ♂, 12.06.2005(Ключко), 1 экз., 16.07.2001, обычен в 08.2001 (опр.Ключко, Матов).
80. *Cucullia biornata* Fischer von Waldheim, 1840: Руб., 2 экз., 6.07.2001, 1.08.2001, 1 экз., 06.1994.
81. *Cucullia balsamitae* Boisduval, 1840: Руб., 3 экз., 5-12.08.2001 (опр.Ключко, Матов).
- **82. *Cucullia inderiensis* Herrich-Schäffer, 1855: окрестности Руб., 1 ♂, 2 ♀♀, 5.04.2001, 1 ♂, 1 ♀,

6.06.2001. Вид считается одним из редчайших среди капюшонниц [Ronkay, Ronkay, 1994]. Впервые найден в Украине и Луганской обл.

83. *Cucullia santonici* (Ньбнер, [1813]): Руб., 1 экз., 4.07.2001; Дав.-Ник., 1 экз., 19.05.2001 (Савкин).

84. *Cucullia gnaphalii* (Ньбнер, [1813]): Стр., 1 экз., 9.07.2002 (Бидзиля).

85. *Cucullia tanacetii* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Руб., 1 экз., 20.05.2001, 1 экз., 06.2001, 1 экз., 12.08.2001.

86. *Cucullia dracunculi* (Ньбнер, [1813]): Руб., 1 экз., 06.2001.

87. *Cucullia asteris* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Руб., 1 экз., 07.2001, единичные бабочки также в мае 1998-1999 гг.; Сев., 1 экз., 05.1989 г., 1 экз., 05.1999;

88. *Cucullia blattariae* (Esper, [1790]): Пров., 1 ♂, 3.06.2002 (Пак).

*89. *Cucullia lanceolata* (Villers, 1789) (= *thapsiphaga* Treitschke, 1826): Руб., 1 экз., 13.06.2005 (Ключко) (опр. Ключко, Матов).

90. *Cucullia lychnitis* Rambur, 1833: Руб., 2 экз., 14-16.06.2002 (опр. Ключко, Матов). Гусеницы 2-го возраста питались на соцветиях коровяка на опушках и полянах смешанного леса в окрестностях Руб. 6.06.2005 (Ключко). До сих пор в Луганской обл. был известен из Стр. [Ключко и др., 2001].

91. *Cucullia verbasci* (Linnaeus, 1758): Руб., 2 экз., 05.2004; Стан-Луг., 1 ♂, 1 ♀, 9.05.2005; Дав.-Ник., 1 экз., 25.07.2001 (Савкин).

92. *Calophasia lunula* (Hufnagel, 1766): Руб., 3 экз., июнь — июль 1999; Стан-Луг., 4 экз., 9.05.2005; Д., 2 экз., 5.05.2005, 16.07.2005 (Коновалов).

93. *Calophasia opalina* (Esper, [1794]): Руб., 1 экз., 2.06.2005.

94. *Omphalophana antirrhinii* (Ньбнер, [1803]): Пров., 1 экз., 05.1999.

95. *Epimecia ustula* (Freyer, 1835): Руб., 1 ♂, 04.1999.

96. *Amphipyra pyramidea* (Linnaeus, 1758): Руб., обычен, собрано 5 экз., июль — август.

97. *Amphipyra berbera* Rungs, 1949: Д., 1 ♂, 31.08.2005, 1 ♀ 8.09.2005 (Коновалов); Руб., 1 экз., 12.07.1998.

98. *Amphipyra perflua* (Fabricius, 1787): Стр., 1 экз., 9.07.2002 (Бидзиля).

99. *Amphipyra livida* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Руб., 2 экз., 10-15.07.2001.

100. *Amphipyra tragopoginis* (Clerck, 1759): Руб., 2 бабочки под корой деревьев, 07.2001.

101. *Amphipyra tetra* (Fabricius, 1787): Руб., 1 ♂, 06.2001; Сев., 1 экз., 22.08.1990. Очень редкий вид.

*102. *Asteroscopus sphinx* (Hufnagel, 1766): окрестности Тош., 6 экз., 14-16.10.2002; Дав.-Ник., 1 экз., 10.10.2001 (Савкин). Редкий вид.

103. *Allophytes oxyacanthae* (Linnaeus, 1758): Руб., 2 экз., 6.10.2001; Тош., 1 экз., 14.10.2002; Дав.-Ник., 1 экз., 4.10.2001 (Савкин).

*104. *Schinia cognata* (Freyer, 1833): Сев., 1 экз., на цветке дикого чеснока днем 11.07.1990.

105. *Heliothis virescens* (Hufnagel, 1766): Руб., единично, май — август.

106. *Heliothis maritima* de Graslin, 1855: Руб., 1 экз., 07.2001, 3 экз., 4-12.06.2005.

107. *Heliothis peltigera* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Руб., 1 экз., 1.10.2001, редко отмечался в августе.

108. *Helicoverpa armigera* (Ньбнер, [1808]): Руб., 5 экз., август — начало сентября; Тош., 2 экз., 09.2002; Стан-Луг., 1 экз., 9.05.2005; Д., 2 экз., 1-7.09.2005 (Коновалов).

109. *Pyrrhia umbra* (Hufnagel, 1766): Руб., 2 экз., 06.1997, 2 экз., 12.06.2005.

110. *Periphanes delphinii* (Linnaeus, 1758): Руб., 1 экз., 8.08.2001, 1 экз., 16.06.2002.

*111. *Cryphia recepticula* (Ньбнер, [1803]): Руб., 6 экз., 15.06 — 4.07.2001.

112. *Cryphia fraudatricula* (Ньбнер, [1803]): Руб., 1 экз., 12.06.2005 (Ключко), 2 экз., 08.2001; Сев., 1 экз., 06.1991; Стр., 1 экз., 23.07.2002; Стан.-Луг., 5 экз., 8-13.07.2002 (Шешурак).

113. *Cryphia algae* (Fabricius, 1775): Руб., 3 экз., 06.2001, 1 экз., 07.2001.

114. *Cryphia raptricula* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Д., 1 экз., 29.06.2005 (Коновалов). До сих пор был известен из Пров. [Ключко, Шешурак, в печати].

115. *Pseudeustrotia candidula* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Руб., 3 экз., 12-14.06.2005.

116. *Spodoptera exigua* (Ньбнер, [1808]): Руб., 6 экз.; Сев., 2 экз. Июнь — сентябрь.

117. *Caradrina morpheus* (Hufnagel, 1766): Руб., 1 ♂, 06.2001; Тош., 1 экз., 2.09.2002; Д., 4 ♂♂, 1 ♀, 27.07-10.08.2005, 1 ♂, 3.09.2005 (Коновалов).

118. *Caradrina (Platyperigea) terrea* (Freyer, 1840): Руб., 2 экз., 08.1998, 2 ♂♂, 08.2001 и 28.09.2001; Д., 1 ♂, 28.07.2005 (Коновалов).

119. *Caradrina (Platyperigea) kadenii* (Freyer, 1836): Руб., 1 ♀, 09.2001; Д., 1 ♂, 21.08.2005, 1 ♀, 28.08.2005 (Коновалов) (опр. Ключко).
120. *Caradrina (Platyperigea) albina* (Eversmann, 1848): Руб., 1 ♀, 09.1996, 1 экз., 06.2004 (опр. Ключко), 1 экз., 12.06.2005 (опр. Матов).
121. *Caradrina (Paradrina) selini* (Boisduval, 1840): Руб., 1 экз., 3.07.2001, 1 ♀, 08.2001 (опр. Ключко), 1 ♂, без даты, 2003 (опр. Матов).
122. *Caradrina (Paradrina) clavipalpis* (Scopoli, 1763): Руб., 3 экз., 06.2001, 1 экз., 08.2004 (опр. Матов); Д., 6 ♂♂, 25.07 -21.08.2005 (Коновалов) (опр. Ключко).
123. *Hoplodrina octogenaria* (Goeze, 1781): Руб., 5 экз., 06.2001.
124. *Hoplodrina blanda* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Руб., 3 экз., 08.1999(опр. Ключко), 1 экз., 08.2001; Тош., 1 экз., 9.10.2002 (опр. Матов).
125. *Hoplodrina superstes* (Ochsenheimer, 1816): Руб., 4 экз., 21.06-30.08.1991, 3 экз., 06.1998; Сев., 2 экз., 06.1991; Д., 1 ♂, 7.08.2005 (Коновалов).
- *126. *Hoplodrina respersa* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Руб., 2 экз., 06.2001, 07.2001 (опр. Матов).
127. *Caradrina (Hoplodrina) ambigua* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Руб., 3 экз., 07.1991, 5 экз., 06.2001, 1 экз., 5.06.2005 (Ключко).
- *128. *Chilodes maritima* (Tauscher, 1806): Руб., 3 экз., 07.2001; Н. А., 1 экз., 21.06.1991.
129. *Charanyca trigrammica* (Hufnagel, 1766): Руб., 1 экз., 06.2001.
130. *Athetis furvula* (Hübner, [1808]): Руб., 2 экз., 07.2001; Сев., 1 ♂, 07.2001.
131. *Proxenus lepigone* (Müschler, 1860): Руб., 2 экз., 27.06-16.07.2001.
132. *Enargia paleacea* (Esper, [1788]): Руб., 2 экз., 07.1998, 3 экз., 06.1999; Сев., 4 экз., 7-26.06.1989.
133. *Enargia abluta* (Hübner, [1808]): Руб., 4 экз., 07.2001, 1 экз., 11.06.2005 (Ключко); Сев., 1 экз., 22.08.1986, 1 экз., 21.08.1989.
134. *Irimorpha retusa* (Linnaeus, 1761): Руб., 2 экз., 21-24.07.1985; Стан.-Луг., 1 экз., 8.07.2002 (Шешурак).
135. *Irimorpha subtusa* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Руб., 1 экз., 07.2001; Стан.-Луг., 2 экз., 2.07 и 28.07.2002 (Шешурак).
136. *Cosmia diffinis* (Linnaeus, 1767): Руб., 1 экз., 07.2001.
137. *Cosmia affinis* (Linnaeus, 1767): Руб., 1 экз., 15.07.1987, 1 экз., 07.1999; Д., 2 экз., 9-30.08.2005 (Коновалов).
138. *Cosmia trapezina* (Linnaeus, 1758): Руб., 3 экз., 06.1989; Сев., 7 экз., 18.06-18.07.1986.
139. *Cosmia pyralina* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Руб., 2 экз., 07.2001, 12.06.2005; Стан.-Луг., 1 экз., 8.05.2005.
140. *Dicycla oo* (Linnaeus, 1758): Руб., 2 экз., 07.1997.
141. *Mesogona oxalina* (Hübner, [1803]): Стан.-Луг., 1 экз., 17.09.2001 (Пак).
142. *Atethmia centrargo* (Haworth, 1809): Руб., 1 экз., 09.1998, 2 экз., 26-27.09.2001.
143. *Dyrtorygia scabriuscula* (Linnaeus, 1758): Руб., 1 экз., 06.2001, обычен в июне — июле.
144. *Trachea atriplicis* (Linnaeus, 1758): Руб., 1 экз., 06.2001; Сев., 1 экз., 12.07.1990; Д., 2 экз., 10-19.08.2005, 2 экз., 2-19.09.2005 (Коновалов).
145. *Thalporhila matura* (Hufnagel, 1766): Д., 2 экз., 3-6.09.2005 (Коновалов) (опр. Ключко).
146. *Actinotia polyodon* (Clerck, 1759): Руб., 2 экз., 19.07.1998; Пров., 1 экз., 08.1999. Впервые отмечен в названном заповеднике.
147. *Chloantha hyperici* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Сев., 1 экз., 06.1991; Д., 1 ♂, 1 ♀, 8.05.2005 (Коновалов). Ранее вид был обнаружен в Стр. и Пров.
148. *Phlogophora meticulosa* (Linnaeus, 1758): Руб., 2 экз., 30.07-21.08.1998, 1 экз., 06.1989; Сев., 1 экз., 06.1989; Д., 1 экз., 25.08.2005 (Коновалов).
149. *Eurplexia luciraga* (Linnaeus, 1758): Руб., 1 экз., 06.1994; Стан.-Луг., 1 экз., 10.07.2002 (Шешурак).
150. *Aratea monoglypha* (Hufnagel, 1766): Руб., 1 экз., 12.06.2005 (Ключко), 2 экз., 13.07.1987; Сев., 1 экз., 21.06.1989, 1 экз., 06.1991.
- *151. *Aratea epomidion* (Haworth, 1809): Руб., 1 ♀, 06.1999.
152. *Aratea oblonga* (Haworth, 1809): Руб., 1 экз., 07.1997, 2 экз., 07.1998, 2 экз., 08.2001; Д., 1 ♂, 27.07.2005 (Коновалов).
153. *Aratea remissa* (Hübner, [1809]): Руб., 1 экз., 29.06.1999.
154. *Aratea anceps* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Руб., 2 ♂♂, 1 ♀, июнь — июль.

155. *Apamea sordens* (Hufnagel, 1766): Руб., 2 экз., 06.1994; Сев., 1 экз., 06.1989, 1 экз., 06.1991.
- *156. *Apamea scolopacina* (Esper, [1788]): Сев., 1 ♀, 07.1996.
157. *Oligia strigilis* (Linnaeus, 1758): Сев., 1 экз., 3.06.1991.
- *158. *Oligia versicolor* (Borkhausen, 1792): Руб., 2 ♂♂, 06.1999 (опр. Ключко). Вид локально распространен в Европе, встречается редко в лесостепной и степной зонах Украины [Nowacki, 1998; Ключко и др., 2001].
159. *Oligia latruncula* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Руб., 3 ♂♂, 11-12.06.2005 (Ключко) (опр. Матов, Ключко), 3 ♂♂, 1 ♀, 06.1999 (опр. Ключко); Сев., 1 экз., 6.06.1989.
160. *Mesoligia furuncula* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Лис., 1 экз., 06.1990; Руб., 1 экз., 06.2001 (опр. Матов), 7 экз., июль — август 1994; Сев., 5 экз., 15.06-3.08.1989.
- *161. *Mesoligia literosa* (Haworth, 1809): Руб., 1 экз., 06.1999.
162. *Mesapamea secalis* (Linnaeus, 1758): Руб., 4 экз., 06.1998; Сев., 1 ♂, 08.1991; Д., 1 ♂, 2.09.2005 (Коновалов).
163. *Mesapamea didyma* (Esper, 1788): Д, 1 ♂, 19.07.2005 (Коновалов) (опр. Матов). Редко встречается в восточных областях Украины [Ключко и др., 2001].
164. *Luperina testacea* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Руб., 2 экз., 9-21.09.2003; Д., 2 экз., 7-10.09.2005 (Коновалов); Стан.-Луг., 3 экз., 13.07.2002 (Шешурак).
165. *Luperina zollikoferi* (Freyer, 1836): Стр., 1 ♀, 10.07.2002 (Бидзиля); Дав.-Ник., 1 ♂, 1 ♀, без даты.
- *166. *Amphipoea oculatea* (Linnaeus, 1761): Пров., 1 ♂, 06.1999 (Пак) (опр. Ключко). Редкий вид, особенно в восточных и южных областях Украины [Ключко и др., 2001].
167. *Amphipoea fucosa* (Freyer, 1830): Руб., 2 ♂♂, 06.1999, 1 ♂, 06.2001 (опр. Ключко).
- *168. *Amphipoea lucens* (Freyer, 1845): Сев., 1 ♂, 29.06.1989 (опр. Ключко). Очень редко встречается в восточных и южных областях Украины [Ключко и др., 2001].
169. *Hydraecia micacea* (Esper, [1789]): Руб., 1 ♀, 08.2001.
170. *Hydraecia ultima* Holst, 1965: Руб., 1 ♀, 06.2001 (опр. Ключко). Вторая находка редкого вида в Луганской обл., 28.07.2002 самец пойман в Стан.-Луг. [Ключко, Шешурак, в печати].
- *171. *Hydraecia osseola* (Staudinger, 1882): Дав.-Ник., 1 ♂, 1 ♀, 20.06.2001 (Савкин).
172. *Gortyna flavago* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Д., 1 экз., 17.09.2005 (Коновалов)..
173. *Gortyna borelii* (Pierret, 1837): Руб., 1 экз., 2.10.2001. Второе местонахождение в области, до сих пор был известен из Стр. [Ключко и др., 2001].
174. *Gortyna cervago* Eversmann, 1844: Дав.-Ник., 1 экз., 14.09.2001 (Савкин).
175. *Helotropha leucostigma* (Hübner, [1808]): Руб., 1 экз., 8.07.1995, 2 экз., 17.07.2003.
176. *Calamia tridens* (Hufnagel, 1766): Руб., 1 экз., 12.07.1987, 1 экз., 6.07.1988.
177. *Staurophora celsia* (Linnaeus, 1758): Гр., 12 экз., 10-20.09.2002; Руб., 20 экз., 10-23.09.2002, 4 экз., 10.09.2003; Сев., 7 экз., 3-12.09.1974, 1 экз., 15.09.1986; Стан.-Луг., 1 экз., 17.09.2001 (Пак).
178. *Chortodes fluxa* (Hübner, [1809]): Руб., 2 экз., 6.07.2001 (опр. Матов).
179. *Chortodes pygmina* (Haworth, 1809): Стр., 2 экз., 9-10.07.2002 (Бидзиля).
180. *Nonagria typhae* (Thunberg, 1784): Руб., 2 экз., 16.07.1986; Пров., 1 экз., 12.07.2001.
181. *Rhizedra lutosa* (Hübner, [1803]): Руб., 3 экз., 11.09.2001.
182. *Archanara geminipuncta* (Haworth, 1809): Руб., 1 экз., 08.2001; Сев., 1 экз., 29.06.1989.
183. *Archanara dissoluta* (Treitschke, 1825): Руб., 2 экз., 07.2001, 1 ♂, 06.2004.
184. *Archanara sparganii* (Esper, [1790]): Руб., 4 экз., 7.07-29.08.2001.
185. *Archanara algae* (Esper, [1789]): Руб., 2 экз., 07.2001.
186. *Sedina buettneri* (E.Hering, 1858): Руб., 1 экз., 10.09.2003.
187. *Arenostola phragmitidis* (Hübner, [1803]): Руб., 1 экз., 07.2001, 1 ♂, 1 ♀, 07.2003.
188. *Episema glaucina* (Esper, 1789): Сев., 1 экз. с датой 06.1991 (вероятно, дата ошибочна, бабочки в Луганской обл. летают в августе-октябре). До сих пор был известен из Стр. [Kljutschko, 1970; Ключко и др., 2001].
189. *Parastichtis suspecta* (Hübner, [1817]): Руб., 2 экз., 07.1999, 1 ♀, 06.2001; Сев., 2 экз., 06. 1991, 07.1990. (опр. Ключко).
190. *Apterogenum ypsilon* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Руб., 4 экз., июнь — июль 2001; Сев., 1 экз., 15.06.1989.
191. *Atypha pulmonaris* (Esper, [1790]): Д., 1 экз., 4.08.2002 (Коновалов).

192. *Cirrhia ocellaris* (Borkhausen, 1792): Руб., 18 экз., 09.2001; Стан.-Луг., 1 экз., 11.09.2002 (Форошук).
193. *Agrochola litura* (Linnaeus, 1758): Руб., 1 ♂, 1 ♀, 09.2001, 1 экз., 10.2002; Тош., 2 экз., 10.2002; Стан.-Луг., 2 экз., 17.09.2001 (Пак), 1 экз., 11.09.2002 (Форошук).
- *194. *Agrochola helvola* (Linnaeus, 1758): Дав.-Ник., 1 экз., 24.09.2001 (Савкин).
195. *Agrochola lota* (Clerck, 1759): Д., 2 ♂♂, 1 ♀, 17-29.10.2005 (Коновалов).
196. *Agrochola macilenta* (Hübner, [1809]): Руб., Тош., единичные особи в октябре.
197. *Agrochola circellaris* (Hufnagel, 1766): Сев., 3 экз., 13-25.10.1990; Д., 1 ♂, 26.10.2005 (Коновалов).
198. *Agrochola laevis* (Hübner, [1803]): Стан.-Луг., 1 экз., 17.09.2001 (Пак).
199. *Conistra vaccinii* (Linnaeus, 1761): Руб., 1 экз., 16.10.1987, 1 экз., 3.10.1997, 7 ♂♂, 2 ♀♀, 04.2001, 1 ♀, 6.10.2001; Сев., 2 экз., 8.10.1990.
200. *Conistra ligula* (Esper, [1791]): Руб., 3 ♀♀, 04.2001; 1 ♂, 1 ♀, 04.2004. Редкий вид.
201. *Conistra rubiginosa* (Scopoli, 1763): Руб., 11 экз., 04.2001; Тош., 1 экз., октябрь, без года; Сл., 1 экз., без даты.
- *202. *Conistra rubiginea* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Дав.-Ник., 2 экз., 9-12.05.2001 (Савкин).
203. *Conistra erythrocephala* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Руб., 6 экз., 04.2003; Тош., 1 ♂, 09-10.2002.
- *204. *Lithophane socia* (Hufnagel, 1766): Сев., 1 экз., 05.1990.
205. *Lithophane ornitopus* (Hufnagel, 1766): Руб., 2 экз., 04.1998, 1 экз., 04.1999; Сл., 1 экз., 05.2002; Стан.-Луг., 2 экз., 9.05.2005.
- *206. *Lithophane furcifera* (Hufnagel, 1766): См., 1 ♂, 3.10.1997; Дав.-Ник., 1 экз., 09.2001 (Савкин).
207. *Xylena exsoleta* (Linnaeus, 1758): Руб., 1 экз., 9.09.1998; Сев., 1 экз., без даты, 1993.
- *208. *Xylena vetusta* (Hübner, [1813]): Руб., 1 экз., 04.2001.
209. *Eupsilia transversa* (Hufnagel, 1766): Руб., 2 экз., 21.03.2001, 2 экз., 23.02.1987.
210. *Dasypolia templi* Thunberg, 1792: Руб., 1 ♀, 5.04.2001; Сев., 1 экз., 12.10.1990, 1 экз., 27.10.1992; Тош., 3 экз., 10. 2002; Д., 1 ♂, 11.10.2005 (Коновалов).
211. *Polymixis polymita* (Linnaeus, 1761): Руб., 1 экз., 2.10.2002.
212. *Polymixis leuconota* (Fivaldsky, 1841) (= *leuconota* Herrich-Schäffer, 1850): Тош., 3 экз., 09.2002; Дав.-Ник., 2 экз., 29.09.2001 (Савкин).
213. *Mniotype satura* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Сев., 1 ♂, 09.1992; Стан.-Луг., 1 экз., 17.09.2001 (Пак), 1 экз., 11.09.2002 (Форошук) (опр. Ключко).
214. *Panolis flammea* ([Denis & Schiffermüller], 1775): смешанный лес в окрестностях Руб., 9 экз., массовый лет в мае 1994-1996 гг.; Стан.-Луг., 12 экз., 8-9.05.2005.
215. *Orthosia miniosa* (Denis & Schiffermüller], 1775): Руб., 1 ♂, 25.04.1999, 5 экз., 19-26.04.2001; Пров., 1 ♂, 1 ♀, 04.1998. Впервые отмечен в названном заповеднике.
216. *Orthosia cerasi* (Fabricius, 1775): Руб., 2 ♂♂, 04.2001 и 04.1999; Сев., 4 экз., 18-26.04.1989 (опр. Ключко).
217. *Orthosia cruda* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Руб., 3 ♂♂, 04.1999, 4 ♂♂, 2 ♀♀, 04.2001; Д., 1 ♂, 27.04.2005 (Коновалов); Стан.-Луг., 1 ♂, 1 ♀, 9.05.2005; Пров., 1 ♂, 04.1998 (опр. Ключко). Впервые отмечен в названных заповедниках.
- *218. *Orthosia populeti* (Fabricius, 1781): Руб., 2 ♂♂, 1 ♀, 04.2001; Сл., 1 экз., 04.1999 (опр. Ключко).
219. *Orthosia gracilis* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Руб., 1 ♂, 04.2001; Стан.-Луг., 2 экз., 9.05.2005.
220. *Orthosia gothica* (Linnaeus, 1758): Руб., 4 экз., 4.04.1989, 1 экз., 04.2001; Д., 1 ♂, 25.04.2005 (Коновалов).
221. *Anorthoa munda* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Руб., 2 экз., 04.1999, 11 экз., 04.2001.
222. *Perigrapha i-cinctum* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Гол., 2 экз., 10.04.1998.
223. *Egira conspicillaris* (Linnaeus, 1758): Стан.-Луг., 2 ♂♂, 4 ♀♀, 8-9.05.2005.
224. *Egira anatolica* (Hering, 1933): Руб., 1 ♂, 04.1999, 3 ♂♂, 1 ♀, 04.2001 (опр. Ключко).
225. *Tholera decimalis* (Poda, 1761): Руб., 1 ♂, 08.1996, 2 ♂♂, 1 ♀, 10-14.09.2001.
- **226. *Tholera hilaris* (Staudinger, 1901): Д., 2 ♂♂, 1 ♀, 3-14.09.2000 (Коновалов). Вид описан из Турции и Сарепты (ныне Красноармейск Волгоградской обл). Ареал включает также Северный Кавказ (Ичкерия), Закавказье (Армения), Приуралье (Оренбургская и Челябинская обл., сопредельные районы Казахстана), Анатолию и Левант (Иерусалим) [Hacker et al., 2002; Nurponen, Fibiger, 2002]. Первая находка в Украине.

227. *Anarta dianthi* (Tauscher, 1809): Руб., 1 ♂, 07.1999, 1 ♀, 06.2001; Сев., 1 ♀, 12.08.1989.
228. *Polia bombycina* (Hufnagel, 1766): Н.-А., 1 экз., 25.06.1986; Руб., 1 экз., 27.06.1988; Сев., 1 экз., 06.1991; Пров., 4 экз., 05.1990, 1 ♂, 06.1999, 1 экз., 11.06.2001. Впервые найден в названном заповеднике.
229. *Polia nebulosa* (Hufnagel, 1766): Руб., 1 экз., 06.1994, 1 экз., 06.1991, 1 экз., 07.2001; Сев., 1 экз., 06.1991; Пров., 2 экз., 06.1999. Впервые найден в названном заповеднике.
230. *Lacanobia w-latinum* (Hufnagel, 1766): Руб., 1 ♂, 12.06.2005, 2 экз., 7.07.2001 (опр. Ключко).
231. *Lacanobia thalassina* (Hufnagel, 1766): Руб., 1 экз., 07.2001; Стр., 1 экз., 6.07.2002 (Бидзиля).
232. *Lacanobia blenna* (Ньбнер, [1824]): Руб., 1 экз., 08.2001.
233. *Melanchra persicariae* (Linnaeus, 1761): Руб., 2 экз., 07.1998.
234. *Hypobarathra icterias* (Eversmann, 1843): Стан-Луг., 6 экз., 7-13.07.2002 (Шешурак).
235. *Hada plebeja* (Linnaeus, 1761): Руб., 5 экз., 11-30.07.1998.
236. *Hyssia cavernosa* (Eversmann, 1842): Руб., 1 ♀, 07.1987.
237. *Sideridis turbida* (Esper, 1790): Руб., 8 экз., июнь — июль 2001, 3 ♂♂, 1 ♀, 12.06.2005.
238. *Sideridis egena* (Lederer, 1853): Сл., 1 ♂, 28.05.1989 (опр. Ключко).
239. *Sideridis rivularis* (Fabricius, 1775): Д., 1 ♀, 13.08.2005 (Коновалов); Стан-Луг., 1 ♂, 8.05.2005.
240. *Sideridis reticulata* (Goeze, 1781): Руб., 1 экз., 07.2001 (опр. Матов), 2 экз., 30.06 -14.07.2001; Пров., 1 экз., 06.1999.
241. *Saragossa siccanorum* (Staudinger, 1870): Руб., 1 экз., 06.2001.
242. *Saragossa porosa* (Eversmann, 1854): Руб., 1 экз., 07.1996 (опр. Ключко).
243. *Conisania leineri* (Freyer, 1836): Руб., 1 ♂, 06.1994 (опр. Ключко, Матов). До сих пор был известен из Стр. [Ключко и др., 2001].
244. *Conisania luteago* ([Denis & Schiffermüller, 1775): Руб., 3 экз., 11.06.1986, 1 экз., 06.1997; Сев., 1 экз., 06.1991.
245. *Hecatera bicolorata* (Hufnagel, 1766): Руб., 1 экз., 1.06.2005; Сев., 2 экз., 24-27.07.2001; Д., 1 экз., 30.07.2005 (Коновалов).
246. *Hecatera dysodea* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Руб., 1 экз., 07.1991; Сев., 1 экз., 06.1991
247. *Hecatera cappa* (Ньбнер, [1809]): Руб., 2 экз., июнь — июль 2001.
248. *Hadena capsincola* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Сев., 1 ♂, 06.1992, 1 экз., 05.1991 (опр. Ключко).
249. *Hadena magnolii* (Boisduval, 1829): Руб., 1 ♂, 06.2001; Сев., 1 ♀, 6.06.1989 (опр. Ключко).
250. *Hadena compta* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Руб., 1 экз., 07.1995.
251. *Hadena filograna* (Esper, [1788]): Руб., 4 ♂♂, 07.2001, 2 ♀♀, 3 ♂♂, 12-14.06.2005; Сев., 1 экз., 06.1985; Стр., 1 ♀, 8.07.1997, 1 ♂, 26.05.1998; Пров., 1 ♂, 20.05.2000 (Рутьян).
252. *Hadena perplexa* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Руб., 2 экз., 7.07.2001.
253. *Hadena irregularis* (Hufnagel, 1766): Руб., 3 экз., 5.06-15.07.1997, 1 ♂, 07.2001; Сев., 1 экз., 5.06.1989.
254. *Hadena tephroleuca* (Boisduval, 1833): Руб., 1 экз., 06.2001.
255. *Mythimna turca* (Linnaeus, 1761): Сев., 1 экз., 05.1991
256. *Mythimna pudorina* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Руб., 1 экз., 06.2001 (опр. Ключко). Вторая находка вида в Луганской обл., ранее был обнаружен в Пров. [Ключко, Шешурак, в печати].
257. *Mythimna conigera* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Руб., 1 экз., 06.2001, 1 экз., 06.2002; Сев., 1 экз., 29.06.1989.
258. *Mythimna pallens* (Linnaeus, 1758): Руб., 2 экз., без даты, 2001.
259. *Mythimna alopecuri* (Boisduval, 1840): Руб., 1 экз., 06.1998, 9 экз., июнь — июль 2001; Сев., 1 экз., 06.1991.
260. *Mythimna sicula* (Treitschke, 1835): Руб., 1 ♂, 06.2001 (опр. Ключко). Вторая находка вида в Луганской обл., ранее был отмечен в Стр. [Ключко и др., 2001].
261. *Mythimna albipuncta* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Руб., 6 экз., 07.2001; Д., 3 экз., 3.09.2005 (Коновалов).
262. *Mythimna ferrago* (Fabricius, 1787): Руб., 1 экз., 07.1994; Стан-Луг., 1 ♂, 2.11.2002.
263. *Mythimna l-album* (Linnaeus, 1767): Руб., 2 экз., 06.2001; Д., 2 экз., 1.09.2005 (Коновалов).
264. *Leucania obsoleta* (Ньбнер, [1803]): Руб., 5 экз., обычен в июне — августе.
265. *Peridroma saucia* (Ньбнер, [1808]): Руб., 1 экз., 06.1998, 1 экз., 06.2001.
- *266. *Dichagyris orientis pseudosignifera* (Boursin, 1952) (ранее в *Yigoga*): Руб., 1 ♂, 07.2001 (опр. Матов); Сев., 1 ♀, 06.1991, 1 ♂, 21.06.1986 (опр. Ключко).

267. *Euxoa conspicua* (Ньбнер, 1827) (= *agricola* Boisduval, 1829): Руб., 1 экз., 07.2001; Пров., 1 экз., 06.1999. Впервые отмечен в названном заповеднике.
268. *Euxoa temera* (Ньбнер, [1808]): Стр., 1 ♂, 19.07.2002 (Шешурак) (опр. Матов).
269. *Euxoa distinguenda* (Lederer, 1857): Руб., 1 ♀, 06.1992, 1 ♀, 07.1998, 1 ♂, 24.06.1999, 5 ♂♂, 07.2001, 2 ♀♀, 08.2001, 1 экз., без даты (опр. Матов, Ключко).
- *270. *Euxoa christophi* (Staudinger, 1870): Руб., 1 ♂, 07.1998, 2 экз., 06.1999, 2 экз., 07.2003, 2 ♂♂, 07.2001, 7 ♂♂, 08.2001, 1 ♂, без даты, 2001, 1 ♂, без даты, 2003 (опр. Матов). Вид описан из Сарепты (ныне г. Красноармейск Волгоградской обл.), Распространен в степях Поволжья и Центральной Азии (Западный Туркестан, юг Ферганы [Fibiger, 1990], в Украине найден в степном Крыму (Евпатория, Керчь) и г. Белгород-Днестровский Одесской обл. [Ключко, 2002; Ключко, Матов, Северов, в печати].
271. *Euxoa obelisca* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Руб., 2 ♂♂ и 2 ♀♀, 08.2001, 1 ♀, 07.2001; Д., 2 ♀♀, 1-4.09.2005 (Коновалов) (опр. Матов, Ключко).
- *272. *Euxoa segnilis* (Duponchel, 1836): Руб., 1 ♂, 30.07.1985, 1 ♂, 07.1994, 6 ♂♂, 2 ♀♀, 06-07.1998, 3 ♂♂, 3 ♀♀, 06-07.1999, 1 ♀, 08.1999, 4 ♂♂, без даты, 2001, 7 ♂♂, 2 ♀♀, 06-07.2001, 15 ♂♂, 8 ♀♀, 08.2001, 1 ♂, 09.2001, 1 ♂, 12.09.2001, 2 ♂♂, без даты, 2003 (опр. Матов, Ключко); Сев., 1 ♂, 5.07.1989, 1 ♀, 8.06.1989 (опр. Ключко). Вид описан с Балканских гор, распространен также в Италии, Венгрии, Румынии, Болгарии, юго-восточной России [Fibiger, 1990]; в Украине был отмечен на Крымском п-ове [Ключко и др., 2001] и в г. Белгород-Днестровский Одесской обл. [Ключко, Матов, Северов, в печати].
273. *Euxoa montivaga* Fibiger, 1997: Пров., 1 ♀, 19.07.2002 (Шешурак); Д., 1 ♀, 7.09.2002 (Коновалов) (опр. Матов).
- *274. *Euxoa nigrofusca* (Esper, [1788]): Руб., 2 экз., 12.06.2005 (Ключко) (опр. Матов).
275. *Euxoa tritici* (Linnaeus, 1761) (= *crypta* (Dadd, 1927)): Руб., 1 ♂, 06.1999, 1 ♂, 1 ♀, 07.2001, 2 ♂♂, 08.2001, 1 ♂, 13.06.2005 (Ключко) (опр. Матов).
- *276. *Euxoa eruta* (Ньбнер, [1827]): Руб., 1 ♀, 06.1994, 1 ♂, 1 ♀, 06.1996, 1 ♀, 08.1997, 2 ♂♂, 2 ♀♀, 06-07.1998, 1 ♂, 06.1999, 2 ♂♂, 1 ♀, 06.2001, 13 ♂♂, 7 ♀♀, 07.2001, 2 ♂♂, 07.07.2001, 5 ♂♂, 1 ♀, 08.2001, 1 ♀, 08.2002, 1 ♀, без даты, 2003, 1 ♂, 1 ♀, 12-14.06. 2005 (Ключко) (опр. Матов). До сих пор в Украине были известны 5 местонахождений [Ключко и др., 2001], изучение коллекционных материалов показало, что вид широко распространен в Полтавской, Черкасской, Запорожской и Донецкой обл. [Ключко, Матов, в печати].
277. *Euxoa nigricans* (Linnaeus, 1761): Руб., 1 ♂, 08.2001 (опр. Матов).
278. *Euxoa aquilina* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Руб., 2 ♂♂, 1 ♀, 07.2001.
279. *Agrotis bigramma* (Esper, [1790]): Руб., 4 экз., июль — август; Стан-Луг., 1 ♂, 1 ♀, 12-13.08.2002; Д., 2 экз., 22-24.08.2005 (Коновалов).
- *280. *Agrotis clavis* (Hufnagel, 1766): Руб., 1 ♂, 07.2001 (опр. Ключко).
281. *Agrotis desertorum* Boisduval, 1840: Руб., 1 ♀, 06.1996, 1 ♀, 07.2001, 1 экз., 5.06.2005 (опр. Ключко, Матов). До сих пор был известен из Стр. [Ключко и др., 2001].
282. *Agrotis ipsilon* (Hufnagel, 1766): Руб., 2 экз., 06.2001.
283. *Axylia putris* (Linnaeus, 1761): Руб., 2 экз., 07.1998; Тош., 1 экз., 07.1999; Д., 2 экз., 21.07.2005, 16.08.2005 (Коновалов); Стан-Луг., 3 экз., 8-9.05.2005.
284. *Ochropleura plecta* (Linnaeus, 1761): Руб., 3 экз., 10-11.06.2005, 4 экз., июнь — июль 2001.
- *285. *Diarsia dahlia* (Ньбнер, [1813]): Пров., 1 ♂, 1 ♀, 06.1999 (Пак) (опр. Ключко). Впервые отмечен в этом заповеднике. В Украине до сих пор было известно 4 местонахождения этого редкого вида, ареал которого охватывает Центральную и Северную Европу, Кавказ, Закавказье и Казахстан [Fibiger, 1993; Ключко и др., 2001].
286. *Diarsia rubi* (Vieweg, 1790): Руб., 1 экз., 06.2001; Сев., 1 экз., 08.1991.
287. *Diarsia florida* (F. Schmidt, 1859): Стан-Луг., 1 ♂, 8.05.2005. Впервые найден в названном заповеднике.
288. *Cerastis rubricosa* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Руб., 1 экз., 04.1999; Пров., 1 экз., 15.05.1998 (Пак); Стан-Луг., 3 ♂♂, 8-9.05.2005. В последнем заповеднике отмечен впервые.
- *289. *Cerastis leucographa* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Руб., 6 экз., 04.1999; См., 1 экз., днем 2.05.2001; Дав.-Ник., 1 экз., 1.05.1998 (Савкин).
- *290. *Rhyacia simulans* (Hufnagel, 1766): Д., 2 ♀♀, 24.07.2005, 7 экз., 28.08-19.09.2005 (Коновалов).
291. *Noctua pronuba* (Linnaeus, 1758): Руб., 2 экз., 06 — 07.2001; Д., 1 экз., 5.09.2005 (Коновалов).
292. *Noctua fimbriata* (Schreber, 1759): Руб., 5 экз., 11-31.07.2001; Стан-Луг., 1 ♀, 27.06.2002.

293. *Noctua orbona* (Hufnagel, 1766): Руб., 2 экз., 06.2001.
294. *Noctua interposita* (Hübner, [1790]): Руб., 1 экз., 12.06.2005 (Ключко); Сев., 1 экз., 11.07.1990; Пров., 2 экз., 13-15.06.2001.
295. *Spaerlotis ravida* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Руб., 1 экз., 05.1994, 1 экз., 07.1998, 3 экз., 12-30.09.2001; Д., 2 экз., 3-9.09.2005 (Коновалов).
296. *Eurois occulta* (Linnaeus, 1758): Руб., 2 экз., 17.07.2001; Пров., 1 экз., 07.1999 (Пак). Впервые отмечен в названном заповеднике.
297. *Anaplectoides prasina* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Руб., 3 экз., 14-17.07.2001; Пров., 1 экз., 06.1999. Впервые отмечен в названном заповеднике.
298. *Xestia baja* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Руб., 1 экз., 1.08.2003; Пров., 1 экз., 7.08.2001. Впервые найден в названном заповеднике.
299. *Xestia sareptana* (Herrich-Schäffer, 1851): Руб., 1 ♂, 07.1995.
300. *Xestia rhomboidea* (Esper, 1790): Руб., 1 экз., 08.1998; Д., 2 ♂♂, 1 ♀, 25.08-1.09.2005 (Коновалов); Стан-Луг., 1 экз., 8.05.2005.
301. *Xestia xanthographa* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Руб., 1 ♂, 1 ♀, 09.2003; Д., 1 экз., 2.09.2005 (Коновалов).
302. *Xestia triangulum* (Hufnagel, 1766): Руб., 2 экз., 06.1994.
303. *Eugnorisma depuncta* (Linnaeus, 1761): Руб., 1 экз., 23.06.2001; Д., 2 экз., 30.08-3.09.2005 (Коновалов).
304. *Naenia typica* (Linnaeus, 1758): Д., 1 ♂, 25.07.2005 (Коновалов).

В настоящее время фауна совок Луганской области насчитывает 423 вида, т.е. здесь их видовой состав богаче чем в любой другой области Украины, исключая Крым. Для сравнения отметим, что в соседней Ростовской области России по сборам 1972–2004 гг. найдено 404 вида совок [Полтавский и др. 2005].

Благодаря активным сборам совок в отделениях Луганского природного заповедника зарегистрирован более обширный видовой состав по сравнению с отмеченным ранее [Ключко, 2002]. Сейчас список совок Стрельцовской степи включает 250, Провальской степи — 230, Станично-Луганского заповедника — 225 видов. Таким образом, сейчас наши представления о фауне совок и современном состоянии степных природных комплексов в условиях Луганщины можно значительно уточнить и расширить.

Благодарности. Авторы искренне благодарны А. В. Бидзиле, О. В. Паку, П. Н. Шешураку, В. П. Форощуку, С. В. Коновалову, Г. Г. Браилко, З. Ф. Ласман, Ю. И. Савкину за предоставление для обработки собранных ими материалов.

Литература

- Ключко З. Ф. 2001(2002). Обзор совок (Lepidoptera, Noctuidae) степных заповедников Украины // Изв. Харьков. энтомолог. общества. Т. IX, вып. 1–2. С. 114–122.
- Ключко З. Ф. 2002. Новые виды совок (Lepidoptera, Noctuidae) фауны Украины // Вестник зоологии. Т. 36(2). С. 10.
- Ключко З. Ф. 2003. Новые и малоизвестные виды совок (Lepidoptera, Noctuidae) фауны Украины // Там же. Т. 37(1). С. 100.
- Ключко З. Ф., Герасимов Р. П., Будашкин Ю. И. 2004. Новые и малоизвестные виды совок (Lepidoptera) фауны Украины // Там же. Т. 38(1). С. 94.
- Ключко З. Ф., Плющ И. Г. 2004. *Catocala lurina* — новый для фауны Украины вид ленточниц (Lepidoptera, Noctuidae, Catocalinae) // Там же. Т. 38(5). С. 38.
- Ключко З. Ф., Плющ И. Г., Шешурак П. Н. 2001. Аннотированный каталог совок (Lepidoptera, Noctuidae) фауны Украины. Киев. 882 с.
- Полтавский А. Н., Артохин К. С., Шмараева А. Н. 2005. Энтомологические рефугиумы в ландшафтных системах земледелия. Ростов на-Дону. 212 с.
- Fibiger M. 1990. Noctuidae Europaeae. Noctuidae I. Vol. 1. Sor III: Entomological Press. 208 p.
- Fibiger M. 1993. Noctuidae Europaeae. Noctuidae II. Vol. 2. Sor III: Entomological Press. 230 p.

- Fibiger M., Hacker H. 2005. Systematic List of the Noctuoidea of Europe (Notodontidae, Nolidae, Arctiidae, Lymantriidae, Erebidae and Noctuidae)// Esperiana. Bd. 11. P. 7–690.
- Hacker H., Ronkay L., Hreblay M. 2002. Noctuidae Europaeae. Vol. 4. Hadeninae 1. Sorшт: Entomological Press. 419 p.
- Kljutschko S. F. 1970. Beitrag zur Kenntnis der Noctuidenfauna der Naturschutzsteppen Streletskaja und Chomutovskaja (Ukrainische SSR) (Lepidoptera, Noctuidae) // Entomol. Berichte. Bd. 30, Hf. 3. S. 37–49.
- Nowacki J. 1998. The Noctuids (Lepidoptera, Noctuidae) of Central Europe. Bratislava. 51 p., 41 pl., 24 col. pl.
- Nupponen K., Fibiger M. 2002. Contribution to the knowledge of the fauna of Bombyces, Sphinges and Noctuidae of the Southern Ural Mountains, with description of a new *Dichagyris* (Lepidoptera: Lasiocampidae, Endromidae, Saturniidae, Sphingidae, Notodontidae, Noctuidae, Panthinae, Lymantriidae, Nolidae, Arctiidae) // Phegea., 30 (4). P. 121-185.
- Rakosy L., Goia M., Kovacs Z. 2003. Catalogul Lepidopterelor Romaniei. Cluj-Napoca. 446 s.
- Ronkay L., Ronkay G. 1994. Noctuidae Europaeae. Vol. 6. Cuculliinae I. Sorшт: Entomological Press 282 p.

Поступила в редакцию 25.01.2006.

РЕЗЮМЕ. На основании обобщения данных многолетних сборов и литературных сведений представлен список совков семейств Nolidae, Erebidae, Noctuidae Луганской области Украины. Впервые в Украине зарегистрированы *Eublemma amasina* (Eversmann, 1842), *Cucullia inderiensis* (Herrich-Schdffer, 1856) и *Tholera hilaris* (Staudinger, 1901), впервые для Луганщины — 37 видов совков. Списки совков заповедников включают: Стрельцовской степи — 250, Провальской степи — 230, Станично-Луганского заповедника — 225 видов. Библ. 16.