

З.Ф. Ключко

Украина, г. Киев, Институт зоологии им. И.И.Шмальгаузена НАН Украины

Совки (Lepidoptera: Noctuidae s.l.) Донецкой области Украины

Z.F. Kljuchko. **On the fauna of noctuids (Lepidoptera: Noctuidae s.l.) of Donetsk Province (Ukraine).**

SUMMARY. A list of 398 species of the noctuid moths (Nolidae, Erebididae, Noctuidae) of Donetsk Province of Ukraine is given on the basis of the long-term collection and literature sources. 28 species are found for the first time in Donetsk Province: *Nycteola degenerana* (Hübner, [1799]), *Earias vernana* (Fabricius, 1787), *Trisateles emortualis* ([Denis & Schiffermüller], 1775), *Acantholipes regularis* (Hübner, [1813]), *Catocala neonympha* (Esper, [1805]), *C. promissa* ([Denis & Schiffermüller], 1775), *Dysgonia algira* (Linnaeus, 1767), *Craniophora pontica* (Staudinger, 1879), *Diachrysia nadeja* (Oberthür, 1880), *Heliothis nubigera* Herrich-Schäffer, 1851, *Euplexia lucipara* (Linnaeus, 1758), *Conistra erythrocephala* ([Denis & Schiffermüller], 1775), *Antitype chi* (Linnaeus, 1758), *Luperina testacea* (Denis & Schiffermüller, [1775]), *Staurophora celsia* (Linnaeus, 1758), *Charanyca trigrammica* (Hufnagel, 1766), *Polymixis trisignata* (Ménétrières, 1848), *Anarta odontites* (Boisduval, 1829), *Cardepia helix* Boursin, 1962, *Hadena tephroleuca asiatica* (F. Wagner, 1931), *Polia hepatica* (Clerck, 1759), *P. nebulosa* (Hufnagel, 1766), *Mythimna impura* (Hübner, 1808), *Euxoa eruta* (Hübner, [1827]), *Agrotis trux* (Hübner, [1824]), *Agrotis puta* (Hübner, [1803]), *Noctua janthina* ([Denis & Schiffermüller], 1775) and *Anaplectoides prasina* ([Denis & Schiffermüller], 1775). The species lists of the nature reserves of Donetsk Province are included: for "Kamennye Mogily" — 230, for "Khomutovskaya Steppe" — 231, for preserve "Velikoanadolsky Les" — 160 species.

Донецкая область занимает юго-восточную часть Украины, гранича на западе с Днепропетровской и Запорожской, на северо-западе с Харьковской, на северо-востоке с Луганской областями, на востоке с Ростовской областью России, на юге достигает побережья Азовского моря. На северо-востоке Донецкой области возвышается Донецкий кряж, высота его в среднем 200-300 м, максимальная — 367 м (гора Могила-Мечетная), на юге области — Приазовская возвышенность. На западе поверхность, постепенно снижаясь, переходит в Приднепровскую низменность, на юге — в Причерноморскую низменность. Самая большая река Северский Донец протекает на сравнительно небольшом расстоянии в северной части области. Остальные реки заметно меньше, часть мелких рек летом пересыхает.

Вся территория области находится в степной зоне. Естественная растительность сохранилась в заповедниках «Хомутовская Степь» и «Каменные Могилы», отчасти по склонам Донецкого кряжа и Приазовской возвышенности, а также на склонах оврагов и балок, редко в поймах рек. Леса занимают 4,8% территории области, преобладают байрачные леса и дубравы, вдоль Северского Донца — сосновые боры и пойменные леса. Главным образом, на охраняемых участках сохранились разнотравно-типчачково-ковыльные степи, а именно, их петрофитный вариант в «Каменных Могилах», ксеротический — в «Хомутовской Степи». На побережье Азовского моря имеются участки с солончаковой растительностью. Характерной особенностью Донецкой области является сильная урбанизация, развитие селитебных ландшафтов, значительные площади заняты терриконами, отвалами, насыпями, карьерами.

Видовой состав совков Донецкой области в настоящее время изучен еще недостаточно, и различные районы исследованы не равномерно. Так, два опубликованных списка совков, найденных

в окрестностях г. Артемовск [Розанов, 1930; Warnecke, 1943], содержат 42 и 23 вида соответственно. Статья Б.Альберти и Й.Соффнера [Alberti, Soffner, 1962] включает 80 видов совков, собранных в городах Донецк (б. Сталино), Горловка, Дружковка, Красный Лиман. Значительные материалы по совкам из окрестностей г.Краматорск хранятся в коллекции Зоологического музея Московского Университета (ЗММУ, бывшая коллекция А.В.Цветаева) и фондах Зоологического института РАН (Санкт-Петербург, ЗИН, сборы А.А.Бунделя). Упомянутые материалы отчасти опубликованы [Медведев, 1950, 1953; Kljutschko, 1970; Ключко, 1978, 1998, 2002; Ключко и др., 2001]. По данным последней сводки («Аннотированного каталога совков фауны Украины») в Донецкой области насчитывалось 367 видов совков. Позднее здесь были найдены еще 3 вида: *Tarachidia candefacta* (Hübner, [1831]), *Apamea scolopacina* (Esper, [1788]), *A. ophiogramma* (Esper [1794]) [Бидзиля и др., 2001; Ключко, Шешурак, 2002; Ключко и др., 2004].

В статье использованы материалы сборов автора, а также Р.В.Ботмана, А.В.Жакова, А.В.Бидзили, Е.В.Рутьяна, О.В.Пака, П.Н.Шешурака, И.Ю.Костюка, С.В.Коновалова, В.Л.Перепечаенко, И.Г.Плюща, И.Г.Северова, Ю.Ф.Совы, А.Лысакова, М.Ф.Бойко и других в заповедниках «Хомутовская Степь» и «Каменные Могилы», заказнике «Великоанадольский Лес» и других пунктах области. Кроме того, изучены около 200 экземпляров совков, собранных в заказнике «Великоанадольский Лес» покойным А.С.Лисецким, а также немногочисленные сборы оттуда О.В.Пака и Р.В.Ботмана. Учтены также материалы коллекции Ю.Ф.Совы из Донецка, с. Брусовка Краснолиманского р-на, с. Дроновка Артемовского р-на и других пунктов.

Сейчас в Донецкой области зарегистрировано 398 видов совков. Впервые для области приведены 28 видов: *Nycteola degenerana* (Hübner, [1799]), *Earias vernana* Fabricius, 1787), *Trisateles emortualis* ([Denis & Schiffermüller], 1775), *Acantholipes regularis* (Hübner, [1813]), *Catocala promissa* ([Denis & Schiffermüller], 1775), *C. neonympha* (Esper, [1805]), *Dysgonia algira* (Linnaeus, 1767), *Acronicta auricoma* ([Denis & Schiffermüller], 1775), *Craniophora pontica* (Staudinger, 1879), *Diachrysia nadeja* (Oberthür, 1880), *Heliothis nubigera* Herrich-Schäffer, 1851, *Antitype chi* (Linnaeus, 1758), *Eremobina pabulatricula* (Brahm, 1791), *Luperina testacea* ([Denis & Schiffermüller], 1775), *Staurophora celsia* (Linnaeus, 1758), *Charanyca trigrammica* (Hufnagel, 1766), *Polymixis trisignata* (Ménétrières, 1848), *Anarta odontites* (Boisduval, 1829), *Cardepija helix* Boursin, 1962, *Hadena tephroleuca asiatica* (F. Wagner, 1931), *Polia hepatica* (Clerck, 1759), *P. nebulosa* (Hufnagel, 1766), *Mythimna impura* (Hübner, 1808), *Euxoa eruta* (Hübner, [1827]), *Agrotis trux* (Hübner, [1824]), *Agrotis puta* (Hübner, [1803]), *Noctua janthina* ([Denis & Schiffermüller], 1775), *Anaplectoides prasina* ([Denis & Schiffermüller], 1775).

Приведенный ниже аннотированный список составлен с учетом современной классификации группы и основанного на ней списка видов фауны Европы [Fibiger, Hacker, 2004], согласно которой совки разделены на несколько семейств. Представители трех семейств (Nolidae, Erebidae и Noctuidae) обитают в Донецкой области. Виды, впервые найденные в Донецкой области, обозначены звездочкой (*). Аннотации видов включают все места сборов, при этом для ранее неопубликованных материалов приводится число собранных экземпляров и даты сборов (общая фенология видов в регионе освещалась ранее [Kljutschko, 1970; Ключко, 1978, 1995, 2005, 2006; Kljutschko, Hacker, 1996; Бидзиля и др., 2001; Ключко и др., 2001; Ключко, Ботман, 2007]).

Принятые сокращения пунктов сборов: Арт. — г. Артемовск; Артм. — горы Артема близ г. Славяногорск; Баб. — п. Бабах-Тарама Першотравневого р-на; Бр. — с. Брусовка Краснолиманского р-на; Брус. — с. Брусино близ Краматорска; Бел.-п. Белосарайская коса Першотравневого р-на; В.Ан. — заказник «Великоанадольский Лес»; Вел. — с. Великомешково Амвросиевского р-на; Волн. — г. Волноваха; Горл. — г. Горловка; Деб. — г. Дебальцево; Дим. — г. Димитров Красноармейского р-на; Дон. — г. Донецк; Дон.Б. — Донецкая биостанция; Дрон. — с. Дроновка Артемовского р-на; Друж. — г. Дружковка; Зак. — с. Закотное Краснолиманского р-на; К. М. — заповедник «Каменные Могилы»; Кар. — с. Карпово Амвросиевского р-на; Карл. — с. Карловка Лозоватского р-на; Кич. — п. Кичиксу Тельмановского р-на; Крам. — г. Краматорск; Кр. — ст. Краматорская; Кр. Л. — г. Красный Лиман; Курд. — ст. Курдюмовка; Лоз. — п. Лозоватский Марьинского р-на; Мар. — г. Мариуполь; Мар. Л. — Мариупольская лесная опытная станция; Наб. — с. Набережное Тельмановского р-на; Ниж. — с. Нижнекрынское Амвросиевского р-на; Нов. — г. Новоазовск; Павл. — п. Павлополь Новоазовского р-на; Пр. — с. Прилежное Краснолиманского р-на; Слав. — г. Славяногорск; Сн. — г. Снежное; г. Соль — без сокращения; Ст. — п. Ступки близ г. Артемовск; Стар. — п. Старобешево; Тор. — г. Торез; Удач. — ст. Удачная Красноармейского р-на;

Укр. — п. Украинка Володарского р-на; Фед. — Федоровский лес Володарского р-на; Хар. — г. Харцизк, Х.С. — заповедник «Хомутовская Степь»; Ч. Яр — г. Часов Яр; Черм. — с. Чермалык Волновахского р-на; Шев. — п. Шевченко Володарского р-на; Щур. — с. Щурово Краснолиманского р-на; Юр. — с. Юрьевка Першотравневого р-на; п. Ялта Першотравневого р-на — без сокращения; Ясин. — г. Ясиноватая; Яцк. — с. Яцковка Краснолиманского р-на; Ясн. — п. Ясногорка близ Краматорска (сборы А.А. Бунделя в колл. ЗИН РАН и ЗММУ).

СПИСОК ВИДОВ

Семейство Nolidae

Подсемейство Chloephorinae

1. *Bena bicolorana* (Fuessly, 1775): В.Ан., К.М., Х.С. [Ключко, 2002, 2005].
2. *Pseudoips prasinana* (Linnaeus, 1758): Арт., Дон., К.М., Слав., Х.С., Яцк. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002]; 9 экз., Бр., июль (Сова).
3. *Nycteola revayana* (Scopoli, 1772): Арт., В.Ан., Крам. [Ключко и др., 2001].
- *4. *Nycteola degenerana* (Hübner, [1799]): 1 экз., Бр., 28.05.2005 (Сова).
5. *Nycteola asiatica* (Krulikovskiy, 1904): К.М., Х.С. [Бидзиля и др., 2001; Ключко и др., 2001].

Подсемейство Eariadinae

6. *Earias clorana* (Linnaeus, 1761): Арт., Горл., Зак., К.М., Крам., Х.С. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002].
- *7. *Earias vernana* (Fabricius, 1787): 1 экз., Бр., 19.07.1996 (Сова).

Семейство Erebidae

Подсемейство Rivulinae

8. *Rivula sericealis* (Scopoli, 1763): Арт., В. Ан., Дон., Х. С. [Ключко и др., 2001, Ключко, 2002, 2005].

Подсемейство Nurepodinae

9. *Schrankia costaestrigalis* (Stephens, 1834): Бр., Ст., Х. С. [Ключко, 1998; Ключко и др., 2001].
10. *Schrankia taenialis* (Hübner, [1809]): Ст. [Ключко, 1998; Ключко и др., 2001].

Подсемейство Eublemminae

11. *Calymma communimacula* ([Denis & Schiffermüller], 1775): К. М. [Ключко, 1995].
12. *Odice arcuinna* (Hübner, 1790): Арт., К. М., Крам., Х. С. [Ключко, 1978; Ключко и др., 2001].
13. *Eublemma minutata* (Fabricius, 1794): окр. Кр. Л., К. М. [Alberti, Soffner, 1962; Ключко и др., 2001]; 1♀, Кр., 18.08.1937 (Бундель).
14. *Eublemma ranonica* (Freyer, 1840): К. М. [Ключко, 1995].
15. *Eublemma rosina* (Hübner, [1803]): К. М., Х. С. [Ключко, 1995; Бидзиля и др., 2001; Ключко и др., 2001].
16. *Eublemma atoeana* (Hübner, [1803]): Арт., В. Ан., Горл., К. М., Х. С., Яцк. [Ключко и др., 2001].
17. *Eublemma purpurina* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Арт., В. Ан., Горл., Дон., К. М., Курд., Ниж., Х. С. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002, 2005]; 1 экз., Мар., 25.08.2005; 1 экз., там же, 31.05.1999 (Ботман).
18. *Eublemma pallidula* (Herrich-Schäffer, 1856): К. М., Х. С. [Бидзиля и др., 2001; Ключко и др., 2001].
19. *Eublemma parallela* (Freyer, 1842): Друж. [Alberti, Soffner, 1962; Ключко и др., 2001].

Подсемейство Herminiinae

20. *Simplicia rectalis* (Eversmann, 1842): В. Ан., Крам. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2005].
21. *Paracolax tristalis* (Fabricius, 1794): Дрон., К. М., Удач., Яцк. [Бидзиля и др., 2001; Ключко и др., 2001; Ключко, 2005].
22. *Macrochilo cribrumalis* (Hübner, 1793): Х. С. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002].
23. *Herminia tarsipennalis* Treitschke, 1835: Дим., Крам., Ясн. [Ключко и др., 2001].
24. *Polygogon tentacularia* (Linnaeus, 1758): В. Ан., Дим., Х. С. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2005].
25. *Pechipogo strigilata* (Linnaeus, 1758): Дим., К. М., Крам., Ст., Ясн. [Ключко и др., 2001]; 1 экз., Бр., 28.05.2005 (Сова).
26. *Pechipogo plumigeralis* (Hübner, [1825]): В. Ан., Дрон. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2005].
27. *Zanclognatha lunalis* (Scopoli, 1763): Арт., В. Ан., К. М., Крам., Слав., Х. С., Яцк. [Kljutschko, 1970; Бидзиля и др., 2001; Ключко и др., 2001; Ключко, 2005].

Подсемейство Нуренинае

28. *Nurpna proboscidalis* (Linnaeus, 1758): К. М., Кр. Л., Х. С. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002].
29. *Nurpna rostralis* (Linnaeus, 1758): В. Ан., Дим., К. М., Х. С. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002, 2005]; 3♀♀, Кр., Ясн., 10.05.1937, 7.09.1937 (Бундель) (ЗИН).

Подсемейство Phytometrinae

30. *Phytometra viridaria* (Clerck, 1759): Арт., Дон., К. М., Х. С. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002].
31. *Colobochoyla salicalis* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Горл., Х. С., Яцк. [Ключко и др., 2001, Ключко, 2002].
- *32. *Trisateles emortualis* ([Denis & Schiffermüller], 1775): 1 экз., Мар., 1998 (Ботман).

Подсемейство АVENTIИНАЕ

33. *Laspeyria flexula* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Дрон., К. М., Яцк. [Ключко и др., 2001].

Подсемейство Calpinae

34. *Calyptra thalictri* (Borkhausen, 1790): К. М. [Ключко и др., 2001].
35. *Scoliopteryx libatrix* (Linnaeus, 1758): Арт., Дим., К. М., Х. С. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002]; 3 экз., Бр., 1.05.1996, 7.06.1996, 12.07.1996 (Сова); 2 экз., Мар., май 1998, 2006 (Ботман).

Подсемейство Catocalinae

36. *Lygephila lubrica* (Freyer, 1846): К. М. [Бидзиля и др., 2001].
37. *Lygephila pastinum* (Treitschke, 1826): В. Ан. [Ключко и др., 2001]; 1 экз., Мар., июль 2000 (Ботман).
38. *Lygephila viciae* (Hübner, [1822]): Волн., К. М., Х. С. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002].
39. *Lygephila cracca* ([Denis & Schiffermüller], 1775): В. Ан., К. М., Х. С. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002, 2005]; 1 экз., Мар., 31.08.2005 (Ботман).
- *40. *Acantholipes regularis* (Hübner, [1813]): 1 экз., Юр., июль 2000 (Ботман). Ближайшие местонахождения — Стрельцовская степь Луганской обл. и окр. Судака, Крым [Ключко, 2003].
41. *Drasteria caucasica* (Kolenati, 1846): Волн., К. М., Удач., Х. С. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002]; 1 экз., Мар., июль 2000; 2 экз., Юр., июль 2000 (Ботман).
42. *Euclidia glyphica* (Linnaeus, 1758): Арт., В. Ан., К. М., Карл., Лоз., Х. С., Ясин. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2005]; 7 экз., Бр., май 1996, июль 2003 (Сова); 3 экз., окр. Стар., берег водохранилища, 26.05-11.06.2000 (Сова); 4 экз., окр. Мар., 1997-2007 (Ботман).

43. *Euclidia mi* (Clerck, 1759): Арт. [Ключко и др., 2001].
44. *Euclidia triquetra* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Арт., В. Ан., Волн., Деб., К. М., Х. С. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002]; 3 экз., Укр., май 2001-2002 (Ботман).
45. *Catephia alchymista* ([Denis & Schiffermüller], 1775): В. Ан., Дрон., Крам. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2005]; 3 ♂♂, 3 ♀♀, Кр., Ясн., 23-24.05.1937, 1 ♂, там же, 4.07.1937 (Бундель) (ЗИН); 2 экз., Бр., 14.07.1997, 15.07.1998 (Сова).
46. *Minucia lunaris* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Арт., В. Ан., Горл., К. М., Крам., Х. С., Ясин. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002, 2005]; 2 экз., Бр., 15.05.2005 (Сова); 1 экз., Кич., 10.05.1999 (Ботман).
- *47. *Dysgonia algira* (Linnaeus, 1767): 1 экз., Мар., 31.08.2005 (Ботман).
48. *Grammodes stolidia* (Fabricius, 1775): К. М., Крам., Х. С. [Бидзиля и др., 2001; Ключко и др., 2001; Ключко, 2002].
49. *Catocala fulminea* (Scopoli, 1763): Арт., Горл., Дон., К. М. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002]; 1 экз., Дрон., 24.07.2003 (Сергеев); 1 экз., Бр., 23.07.1997 (Сова); 2 экз., Мар., июль 2000 и 2003 (Ботман).
- *50. *Catocala neonympa* (Esper, [1805]): 1 ♀, Юр., 7- 19.07.2000, в зарослях солодки, 1 экз., там же на свет; 1 экз., Мар., июнь 2003 (Ботман).
51. *Catocala hymenaea* ([Denis & Schiffermüller], 1775): К. М., Крам., Х. С. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002]; 1 экз., Мар., 1997 (Ботман).
52. *Catocala fraxini* (Linnaeus, 1758): окр. Волн., 1 экз. (без даты) (Бойко) [Ключко и др., 2001]; Бр., 4 экз., 6.08.2005 (Сова). Внесен в Червону книгу України [1994].
53. *Catocala nupta* (Linnaeus, 1767): Арт., В. Ан., Дим., К. М., Ниж., Пр., Х. С. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002, 2005]; 1 экз., Дон., 24.07.1978; 1 экз., Бр., 11.07.2003 (Сова); 1 ♂, Мар., 9.08.2006; 4 экз., там же, июль 1997-2007 (Ботман).
54. *Catocala electa* (Vieweg, 1790): Арт., Крам. [Ключко и др., 2001].
55. *Catocala elocata* (Esper, [1787]): Арт., Горл., Дим., Дон., Х. С. [Kljutschko, 1970; Ключко и др., 2001]; 5 экз., Дон., 26.07-20.08.2001 (Сова); 1 экз., Бр., 10.07.1996 (Сова); 2 экз., Мар., 24.07.1997 и сентябрь 2002 (Ботман).
56. *Catocala puerpera* (Gignea, 1791): Арт., Крам. [Ключко и др., 2001]; окр. Мар., 1 ♂, 25.08.2005; 1 экз., там же, июль 2003; 1 экз., Бел., август 1998; 1 экз., Шев., 7.07.2007; 1 экз., Павл., 26.08.2007 (Ботман); 3 экз., Дон., 20.08.1995, 28.07.2000, 8.09.2000 (Сова); 1 экз., п. Ялта на Бел. косе, 20.08.2005 (Ботман).
57. *Catocala sponsa* (Linnaeus, 1767): В. Ан., Горл., К. М. [Alberti, Soffner, 1962; Бидзиля и др., 2001; Ключко, 2005]; 1 экз., Бр., 21.07.1996 (Сова); 3 экз., В. Ан., июль 2000-2005; 1 экз., Мар., июль 2002; 2 экз., Фед., июль 2002 (Ботман). Внесен в Червону книгу України [1994].
- *58. *Catocala promissa* ([Denis & Schiffermüller], 1775): 1 экз., Бр., 10.07.1996 (Сова); 2 экз., В. Ан., июль 2001 и 2003 (Ботман); 1 ♂, Дрон., 24.07.2003 (Сергеев); 1 экз., Х. С., 10-12.07.2002 (Рутьян).

Подсемейство Euteliinae

59. *Eutelia adulatrix* (Hübner, [1813]): В. Ан., Вел., К. М., Х. С. [Бидзиля и др., 2001; Ключко и др., 2001; Ключко, 2002]; 1 экз., Мар., июль 2000 и 2003 (Ботман).

Семейство Noctuidae

Подсемейство Plusiinae

60. *Abrostola tripartita* (Hufnagel, 1766): Арт., В. Ан., Зак., К. М., Слав., Х. С. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2005]; 1 ♂, 1 ♀, Бр., 31.07.1995 и 7.08.2005 (Сова).
61. *Abrostola asclepiadis* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Арт., К. М., Х. С. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002]; 1 ♂, Бр., 3.05.1996 (Сова) (опр. Ключко); в последние годы встречается редко [Ключко, Матов, 2007].

62. *Abrostola triplasia* (Linnaeus, 1758): Арт., В. Ан., Дон., Дрон., Зак., К. М., Слав., Х. С., Яцк. [Ключко и др., 2000; Ключко, 2005]; 1 экз., Мар., 2003 (Ботман).

63. *Trichoplusia ni* (Hübner, [1803]): Дон., Х. С. [Kljutschko, 1970; Ключко и др., 2001]; 2 экз., Мар., 24-28.08.2007 (Ботман).

64. *Macdunnoughia confusa* (Stephens, 1850): повсеместно [Ключко и др., 2001; Ключко, 2005].

65. *Diachrysia chrysitis* (Linnaeus, 1758): повсеместно [Ключко и др., 2001].

66. *Diachrysia stenochrysis* (Warren, 1913): повсеместно вместе с предыдущим видом.

*67. *Diachrysia nadeja* (Oberthür, 1880): 1 экз., окр. Стар., западный берег Старобешевского водохранилища, 24.07.2004 (Сова). Найден также в с. Вакаловщина близ г.Сумы [Ключко, 2003].

68. *Euchalcia consona* (Fabricius, 1787): К. М., Х. С. [Бидзиля и др., 2001; Ключко и др., 2001].

69. *Polychrysia moneta* (Fabricius, 1787): Арт. [Ключко и др., 2001].

70. *Panchrysia aurea* (Hübner, [1803]): К. М., Х. С. [Ключко, 1995; Ключко и др., 2001].

71. *Lamprotes c-aureum* (Knoch, 1781): Дрон. [Ключко, 1998; Ключко и др., 2001].

72. *Autographa gamma* (Linnaeus, 1758): повсеместно [Ключко и др., 2001].

73. *Autographa bractea* ([Denis & Schiffermüller], 1775): К. М. [Ключко, 1995].

74. *Cornutiplusia circumflexa* (Linnaeus, 1767): Х. С. [Kljutschko, 1970].

75. *Plusia festucae* (Linnaeus, 1758): Арт., Вел., К. М., Пр., Х. С. [Бидзиля и др., 2001; Ключко и др., 2001]; 3 экз., Бр., 6-19.07.1996 (Сова); 1 экз., Мар., 1998 (Ботман).

76. *Plusia putnami* (Grote, 1873): К. М. [Бидзиля и др., 2001].

Подсемейство Eustrotiinae

77. *Phyllophila obliterata* (Rambur, 1833): Арт., Горл., Дрон., К. М., Х. С. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002].

78. *Tarachidia candefacta* (Hübner, [1831]): 1♂, К. М., 20.06.1999 (Бидзиля) [Ключко, 2004]; 1 экз., Мар., 25.08.2005 (Ботман); 1 экз., Х. С., 6.06.2004 (Рутьян).

79. *Deltote uncula* (Clerck, 1759): Дрон., Х. С. [Ключко и др., 2001].

80. *Deltote bankiana* (Fabricius, 1775): Дрон., Х. С., Яцк. [Ключко и др., 2001]; 1 экз., Бр., 2.06.1996, 1♂, 9.06.2006 (Сова).

Подсемейство Acontinae

81. *Acontia lucida* (Hufnagel, 1766): повсеместно [Ключко и др., 2001].

82. *Acontia titania* (Esper, [1798]): Арт., Горл., К. М., Крам., Х. С. [Бидзиля и др., 2001; Ключко и др., 2001; Ключко, 2002]; 1 экз., Хар., 7.06.2000 (Сова).

83. *Acontia trabealis* (Scopoli, 1763): повсеместно [Ключко и др., 2001].

84. *Aedia funesta* (Esper, [1766]): Арт., В. Ан., Горл., Дим., Зак., К.М., Слав., Удач., Х. С. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002, 2005].

Подсемейство Pantheinae

85. *Colocasia coryli* (Linnaeus, 1758): Арт., В. Ан., Горл., Дрон., К. М., Х. С., Яцк. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002, 2005].

Подсемейство Dilobinae

86. *Diloba caeruleocephala* (Linnaeus, 1758): К. М. [Бидзиля и др., 2001]; 2 экз., Тор., 27.09.2006 (Коновалов).

Подсемейство Acronictinae

87. *Oxicesta geographica* (Fabricius, 1787): Арт., Горл., К.М., Х. С., Яцк. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002, 2005]; 3 экз., Бр., 28.05.2005 (Сова); 2 экз., Мар., май 2003; 1 экз., Павл., 2.07.2006; 1 экз., Укр., май 2003 (Ботман).

88. *Moma alpium* (Osbeck, 1778): В. Ан., Горл., Дрон., К. М., Крам. [Бидзиля и др., 2001; Ключко и др., 2001; Ключко, 2005]; 1 экз., Бр., 8.08.2005 (Сова).
89. *Acronicta cuspis* (Hübner, [1813]): К. М. [Бидзиля и др., 2001].
90. *Acronicta tridens* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Арт., В. Ан., Волн., Дим., Дон., К. М., Кр. Л., Удач., Х. С. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002, 2005]; 1 экз., Мар., 2007 (Ботман).
91. *Acronicta psi* (Linnaeus, 1758): Арт., В. Ан., К. М., Сн., Х. С. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002, 2005]; 1 экз., Бр., 26.07.1997 (Сова).
92. *Acronicta aceris* (Linnaeus, 1758): Арт., В. Ан., Горл., Дон., К. М., Х. С. [Медведев, 1950; Ключко и др., 2001; Ключко, 2002].
93. *Acronicta megacephala* ([Denis & Schiffermüller], 1775): В. Ан., Вел., Горл., Дим., Дон., Дрон., К. М., Сн., Удач., Х. С., Яцк. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002, 2005]; 3 экз., Бр., 28.07.1997, 2-5.08.2005 (Сова); 2 экз., Мар., 9.07.2006, 26.09.2006 (Ботман).
94. *Acronicta strigosa* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Дрон. [Ключко и др., 2001].
- *95. *Acronicta auricoma* ([Denis & Schiffermüller], 1775): 1♂, Мар., 26.09.2006 (Ботман).
96. *Acronicta euphorbiae* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Зак., Слав. [Ключко и др., 2001].
97. *Acronicta rumicis* (Linnaeus, 1758): повсеместно [Ключко и др., 2001; Ключко, 2005].
98. *Craniophora ligustri* ([Denis & Schiffermüller], 1775): В. Ан., Волн., Горл., Дрон., К. М. [Бидзиля и др., 2001; Ключко и др., 2001; Ключко, 2005]; 2 экз., Бр., 28.05.2005; 5 экз., там же, 20-25.07.1997 (Сова); 1♂, Кр., 24.07.1937 (Бундель) (ЗИН).
- *99. *Craniophora pontica* (Staudinger, 1879): 1 экз., Х. С., 2.07.2001 (Рутьян).
100. *Simyra nervosa* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Арт., К. М., Х. С. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002]; 1 экз., Укр., август 2003 (Ботман).
101. *Simyra albovenosa* (Goeze, 1781): Арт., Дим., Дрон., К. М., Х. С. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002]; 1 экз., Бр., 28.07.1997 (Сова).

Подсемейство Metoropinae

102. *Apaustis rupicola* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Кар., К. М. [Бидзиля и др., 2001; Ключко и др., 2001].
103. *Aegle kaekeritziana* (Hübner, [1799]): Арт., К. М., Х. С. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002].
104. *Mysteroplus puniceago* (Boisduval, 1840): Арт., В. Ан., Вел., Горл., Зак., К. М., МарЛ., Слав., Х. С., Ч. Яр [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002, 2005]; 1 экз., Мар., 31.08.2005 (Ботман).
105. *Tyta luctuosa* ([Denis & Schiffermüller], 1775): повсеместно [Ключко и др., 2001; Ключко, 2005].

Подсемейство Cuculliinae

106. *Cucullia argentina* (Fabricius, 1787): К. М. (Бидзиля и др., 2001). Внесен в Червону книгу України [1994].
107. *Cucullia fraudatrix* Eversmann, 1837: Арт., Горл., К. М., Яцк. [Alberti, Soffner, 1962; Ключко и др., 2001]; 1 экз., Бр., без даты (Сова).
108. *Cucullia absinthii* (Linnaeus, 1761): Арт., К. М., МарЛ., Х. С., Яцк. [Ключко и др., 2001]; 2 экз., Бр., 8-10.08.2005 (Сова).
109. *Cucullia argentea* (Hufnagel, 1766): Дон.Б. [Бартенев, Грамма, 1996]. Внесен в Червону книгу України [1994].
110. *Cucullia artemisiae* (Hufnagel, 1766): К. М., Х. С., Яцк. [Ключко и др., 2001]; 1♂, 1♀, Бр., 8-10.08.2005 (Сова).
111. *Cucullia lactea* (Fabricius, 1787): К. М., Х. С. [Ключко и др., 2001].
112. *Cucullia xeranthemi* Boisduval, 1840: К. М., Х. С. [Ключко и др., 2001].
113. *Cucullia lactucae* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Арт., Дон., К.М., Крам., Яцк. [Ключко и др., 2001].
114. *Cucullia fraterna* Butler, 1878: Арт. [Ключко, 1998; Ключко и др., 2001]; 1♂, К. М., 28.05.1999 (Бидзиля) (опр. Матов). Исследование препарата гениталий показало, что в этом заповеднике

распространен указанный выше вид, а не *C. lucifuga* ([Denis & Schiffermüller], 1775). Последний обнаружен в Карпатах, Черниговской и Сумской обл. [Ключко, Матов, 2005].

115. *Cucullia umbratica* (Linnaeus, 1758): Дим., Дон., Зак., К. М., Удач., Х. С. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002]; 2 экз., Бр., 24-27.07.1997 (Сова); 1♀, Тор., 20.07.2004 (Сова); 1♂, 1♀, Мар., 1999 (Ботман).

116. *Cucullia biornata* Fischer von Waldheim, 1840: Дим., К. М., Х. С. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002]; 1♀, Мар., 25.08.2005; 1 экз., там же, 22.07.2006 (Ботман).

117. *Cucullia balsamitae* Boisduval, 1840: окр. Кр. Л. [Ключко и др., 2001].

118. *Cucullia campanulae* Freyer, [1831]: окр. Кр. Л. [Alberti, Soffner, 1962; Ключко и др., 2001].

119. *Cucullia santonici* (Hübner, [1816]): Горл., окр. Дон., К. М., Х. С. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002].

120. *Cucullia tanacetii* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Арт., К. М., Х. С., Яцк. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002].

121. *Cucullia dracunculi* (Hübner, [1813]): Арт., К. М., Х. С. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002]; 1♂, Бр., 17.07.1996 (Сова).

122. *Cucullia asteris* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Арт., Горл., Дон., К. М., Х. С. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002]; 1♂, Бр., 19.07.2006 (Сова).

123. *Cucullia scrophulariae* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Х. С. [Kljutschko, 1970; Ключко и др., 2001].

124. *Cucullia lanceolata* (Villers, 1789) (= *thapsiphaga* Treitschke, 1826): К. М. [Бидзиля и др., 2001; Ключко и др., 2001].

125. *Cucullia lychnitis* (Rambur, 1833): окр. Дон., К. М., Х. С. [Бидзиля и др., 2001; Ключко и др., 2001].

126. *Cucullia verbasci* (Linnaeus, 1758): Х. С. [Kljutschko, 1970; Ключко и др., 2001]; 1 экз., Бр., 2.06.1996 (Сова).

Подсемейство Oncocnemidinae

127. *Calophasia lunula* (Hufnagel, 1766): Деб., Дон., Зак., К. М., Ниж., Х. С. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002]; 2 экз., Бр., 15-29.05.2005 (Сова).

128. *Calophasia opalina* (Esper, [1794]): Арт., Дон., К. М., Х. С. [Бидзиля и др., 2001; Ключко и др., 2001; Ключко, 2002]; 1 экз., Мар., 11.06.2005 (Ботман); 1♂, Щур., 12.07.2005 (Сова).

129. *Omphalophana antirrhinii* (Hübner, [1803]): К. М., Х. С. [Бидзиля и др., 2001; Ключко и др., 2001; Ключко, 2002].

130. *Oncocnemis confusa* (Freyer, [1839]): Арт., Х. С. [Ключко, 1994; Ключко и др., 2001].

131. *Erimecia ustula* (Freyer, 1835): К. М., Х. С. [Бидзиля и др., 2001; Ключко и др., 2001].

Подсемейство Amphipyrginae

132. *Amphipyra pyramidea* (Linnaeus, 1758): Горл., Дрон., К. М., Х. С., Ч. Яр [Бидзиля и др., 2001; Ключко и др., 2001; Ключко, 2002]; 7 экз., Бр., июль 2004-2005 (Сова); 3 экз., Дон., 15-17.07.1999 (Сова); 2 экз., Мар., 9.09.2005, там же, 30.09.2006, за 3 часа прилетели 52 экз. (Ботман); 1♂, Ясин., 30.06.2002 (Пак).

133. *Amphipyra berbera* Rungs, 1949: 1♂, Ясин., август 1977 [Ключко, 1980]; 1 экз., там же, 30.06.2002 (сборщик неизвестен).

134. *Amphipyra livida* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Арт., В. Ан., К. М., [Бидзиля и др., 2001; Ключко и др., 2001; Ключко, 2005]; 1 экз., Мар., 12.10.2005 (Ботман).

135. *Amphipyra tragopoginis* (Clerck, 1759): Арт., Дим., К. М., Сн., Х. С. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002].

136. *Amphipyra tetra* (Fabricius, 1787): окр. Арт. [Ключко, 1998; Ключко и др., 2001].

Подсемейство Psaphidinae

137. *Allophytes oxyacanthae* (Linnaeus, 1758): Арт., Волн., К. М., Х. С. [Ключко и др., 2001]; 1 экз., В. Ан., 1.10.2000 (Пак).

Подсемейство Heliothinae

138. *Schinia cardui* (Hübner, 1790): Арт., Дон., МарЛ. [Ключко, 1998; Ключко и др., 2001]; 1 экз., Юр., июль 2006 (Ботман).

139. *Schinia cognata* (Freyer, 1833): К. М., МарЛ. [Ключко, 1995; Ключко и др., 2001].

140. *Schinia scutosa* ([Denis & Schiffermüller], 1775): повсеместно [Ключко и др., 2001; Ключко, 2005].

141. *Pyrocleptria cora* (Eversmann, 1837): К. М. [Ключко, 1995].

142. *Heliothis viriplaca* (Hufnagel, 1766): Вел., Дим., Дон., К. М., Ниж., Х. С. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002]; 5 экз., Бр., июль-август 2005 (Сова).

143. *Heliothis maritima* de Graslin, 1855: повсеместно [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002, 2005].

144. *Heliothis peltigera* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Дон., К. М. [Бидзиля и др., 2001; Ключко и др., 2001; Ключко, 2002].

*145. *Heliothis nubigera* Herrich-Schäffer, 1851: 1 экз., Мар., 24.08.2007 (Ботман). Известен из Крыма, г.Сумы и Карпат [Ключко, 2006]. Возможно, мигрант.

146. *Helicoverpa armigera* (Hübner, [1808]): Арт., Дон., К. М., Х. С. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002]; 4 экз., Бр., июль-август 2005 ; 3 экз., Стар., западный берег Старобешевского водохранилища, 8.09.2000 (Сова); 7 экз., Мар., 25.08-21.09.2005 (Ботман); 2 экз., Тор., 27.09.2006 (Коновалов).

147. *Pyrrhia umbra* (Hufnagel, 1766): Арт., Дон., Ниж., К. М., Х. С., Ясин. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002]; 5 экз., Бр., июль-август 1997 (Сова); 1 экз., Мар., 1999 (Ботман).

148. *Periphanes delphinii* (Linnaeus, 1758): Арт., Дон. Б., Зак., К. М., Ниж., Х. С. [Бартенев, Грамма, 1996; Ключко и др., 2001; Ключко, 2002]; 1 экз., Юр., июль 2000 (Ботман). Внесен в Червону книгу України [1994].

149. *Aedophron rhodites* (Eversmann, 1851): Арт., К. М., Х. С. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002].

Подсемейство Bryophilinae

150. *Cryphia receptricula* (Hübner, [1803]): К. М. [Ключко, 1995]; 1 экз., Мар., июль 2002 (Ботман).

151. *Cryphia fraudatricula* (Hübner, [1803]): Дрон., Х. С. [Клjutschko, 1970; Ключко и др., 2001].

152. *Cryphia algae* (Fabricius, 1775): Волн., К. М., Сн. [Бидзиля и др., 2001; Ключко и др., 2001].

153. *Cryphia raptricula* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Арт., Волн., К. М., Х. С. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002].

154. *Cryphia orthogramma* Boursin, 1954: К. М. [Ключко, 1995; Бидзиля и др., 2001; Ключко и др., 2001].

155. *Cryphia muralis* (Forster, 1771): 1 экз., К. М., 1.07.1997 (Пак) [Ключко и др., 2001].

Подсемейство Хуленинае

156. *Pseudeustrotia candidula* ([Denis & Schiffermüller], 1775): повсеместно [Ключко и др., 2001; Ключко, 2005].

157. *Spodoptera exigua* (Hübner, [1808]): Арт., Дон., Дрон., К. М., Х. С. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002].

158. *Elaphria venustula* (Hübner, 1790): Х. С. [Ключко и др., 2001].

159. *Caradrina morpheus* (Hufnagel, 1766): Арт., В. Ан., Волн., К. М., Х. С. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002]; 1 экз., Бр., 28.05.2005 (Сова); 1♀, Мар., 23.08.2006 (Ботман).

160. *Caradrina terrea* Freyer, 1840: Арт., В. Ан., Зак., Х. С. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002, 2005].

161. *Caradrina kadenii* Freyer, 1836: Арт. [Ключко и др., 2001]; 1 экз., Мар., 1999 (Ботман).
162. *Caradrina albina* Eversmann, 1848: Арт., В. Ан., Волн., Горл., Дим., К. М., Х. С. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002].
163. *Caradrina selini* Boisduval, 1840: Арт., Дрон., Х. С. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002]; 1 экз., Мар., 20.08.2006 (Ботман).
164. *Caradrina wullschlegeli* Püngeler, 1903: Арт., В. Ан., Волн., Дрон., К. М., Х. С. [Ключко, 1998, 2005; Ключко и др., 2001].
165. *Caradrina flavirena* Guenée, 1852: Горл., Х. С. [Alberti, Soffner, 1962; Ключко и др., 2001].
166. *Caradrina clavipalpis* (Scopoli, 1763): Арт., В. Ан., Волн., Горл., Дим., Дон., К. М., Ниж., Слав., Х. С. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002, 2005]; 3 экз., Бр., 25-26.07.1996 (Сова); 1 экз., Дрон., 2.07.2003 (Сова).
167. *Hoplodrina octogenaria* (Goeze, 1781): Арт., В. Ан., Горл., Дон., Дрон., К. М., Слав., Х. С. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002, 2005]; 2 экз., Бр., 8.07.2006, 6.08.1997 (Сова).
168. *Hoplodrina blanda* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Арт., В. Ан., Горл., Дрон., К. М., Х. С. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002, 2005]; 2♂♂, Бр., 26.07.1997, 9.07.2006 (Сова).
169. *Hoplodrina superstes* (Ochsenheimer, 1816): Арт., В. Ан., Дрон., К. М., Яцк. [Бидзилия и др., 2001; Ключко и др., 2001; Ключко, 2005].
170. *Hoplodrina ambigua* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Арт., В. Ан., К. М., Х. С. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002, 2005]; 1♂, Бр., 10.08.2005, 1♀, там же, 28.05.2005 (Сова); 6 экз., Мар., 25.08-9.09.2005, 1♂, там же, 30.09.2006 (Ботман).
171. *Chilodes maritima* (Tauscher, 1806): Х. С. [Kljutschko, 1970].
172. *Rusina ferruginea* (Esper, [1785]): Арт., В. Ан., Дрон., К. М. [Бидзилия и др., 2001; Ключко и др., 2001; Ключко, 2005].
- *173. *Charanyca trigrammica* (Hufnagel, 1766): 1 экз., В. Ан., 17.06.1968 (Лисецкий); 1 экз., Бр., 14.06.1997 (Сова); 1 экз., Мар., июнь 2000 (Ботман).
174. *Athetis gluteosa* (Treitschke, 1835): Слав., Х. С. [Ключко и др., 2001].
175. *Athetis furvula* (Hübner, [1808]): Арт., Вел., Волн., Горл., К. М., Ниж., Слав., Х. С., Яцк. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002]; 1♂, Дон., 1.08.2006 (Сова); 1♂, Тор., 20.09.2006 (Коновалов).
176. *Proxenus lepigone* (Möschler, 1860): Арт., В. Ан., Горл., К. М., Х. С. [Alberti, Soffner, 1962; Ключко и др., 2001; Ключко, 2002]; 1♀, Бр., 27.07.2005 (Сова).
177. *Enargia paleacea* (Esper, [1788]): Арт., К. М., МарЛ. [Бидзилия и др., 2001; Ключко и др., 2001]; 1 экз., Бр., 26.07.1996 (Сова).
178. *Enargia abluta* (Hübner, [1808]): Арт., Волн., Удач., Х. С. [Kljutschko, 1970; Ключко и др., 2001].
179. *Irimorpha retusa* (Linnaeus, 1761): Х. С. [Kljutschko, 1970].
180. *Irimorpha subtusa* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Дон. [Ключко и др., 2001].
181. *Cosmia diffinis* (Linnaeus, 1767): Арт., Горл., Дрон., К. М., Слав., Х. С., Ч. Яр, Яцк. [Alberti, Soffner, 1962; Ключко и др., 2001]; 1 экз., Бр., 16.06.2000 (Сова); 2 экз., Мар., 21-22.07.2006 (Ботман).
182. *Cosmia affinis* (Linnaeus, 1767): Арт., Горл., Дрон., К. М. [Бидзилия и др., 2001; Ключко и др., 2001]; 1 экз., В. Ан., 1.10.1999 (Сова); 1 экз., Мар., 1998 (Ботман).
183. *Cosmia pyralina* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Арт., Горл., Дрон., К. М. [Ключко и др., 2001]; 1 экз., Бр., 28.05.2005 (Сова); 1 экз., К. М., 29.06.2001 (Рутьян); 2 экз., Мар., июнь 2002 (Ботман); 2 экз., Х. С., 4.07.2001 (Рутьян).
184. *Cosmia trapezina* (Linnaeus, 1758): В. Ан., Горл., Дрон., К. М., Пр., Ч. Яр, Яцк. [Бидзилия и др., 2001; Ключко и др., 2001; Ключко, 2005]; 2 экз., Мар., 1998 (Ботман).
185. *Dicycla oo* (Linnaeus, 1758): Горл., Деб., Дрон. [Ключко и др., 2001]; 8 экз., В. Ан., 4-17.06.1968 (Лисецкий) [Ключко, 2005].
186. *Atethmia ambusta* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Арт. [Ключко и др., 2001].
187. *Atethmia centrago* (Haworth, 1809): Арт., В. Ан., Карл., Х. С. [Ключко и др., 2001]; 2 экз., Мар., 1-9.09.2005 (Ботман).
188. *Mesogona acetosellae* ([Denis & Schiffermüller], 1775): В. Ан., К. М., Х. С. [Ключко, 1995; Ключко и др., 2001].

189. *Dypterygia scabriuscula* (Linnaeus, 1758): Арт., В. Ан., Горл., Дон., К. М., Х. С. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002, 2005]; 1 экз., Бр., без даты (Сова); 1 экз., Мар., 20.08.2006 (Ботман).
190. *Trachea atriplicis* (Linnaeus, 1758): Арт., Горл., Дон., К. М. [Бидзиля и др., 2001; Ключко и др., 2001]; 2 экз., Баб., 10-20.06.2007 (Ботман); 3 экз., Бр., 28.05- 8.07.2005 (Сова); 3 экз., Мар., 29.08.2006, 1-9.09.2005 (Ботман).
191. *Thalrophila matura* (Hufnagel, 1766): К. М., Х. С. [Бидзиля и др., 2001; Ключко и др., 2001].
192. *Actinotia polyodon* (Clerck, 1759): Арт., Яцк. [Ключко и др., 2001].
193. *Chloantha hyperici* ([Denis & Schiffermüller], 1775): окр. Арт., Горл., К. М. [Бидзиля и др., 2001; Ключко и др., 2001].
194. *Phlogophora meticulosa* (Linnaeus, 1758): К. М., Х. С. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002]; 1 экз., Бр., 15.05.2005 (Сова); 1 экз., Дон., 15.09.2004 (Пак); 1 экз., Мар., август 2001 (Ботман).
- *195. *Euplexia lucipara* (Linnaeus, 1758): 1 экз., Бр., 28.05.2005 (Сова).
196. *Auchmis detersa* (Esper, [1787]): окр. Волн. [Ключко и др., 2001].
197. *Oxytripia orbiculosa* (Esper, [1799]): Х. С. [Ключко и др., 2001].
198. *Arapea monoglypha* (Hufnagel, 1766): Волн., Горл., Дон., К. М., МарЛ., Х. С. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002]; 1 экз., Бр., 14.07.1996 (Сова); 1♂, Ясин., 30.06.2002 (Пак).
199. *Arapea lateritia* (Hufnagel, 1766): окр. Волн. [Ключко и др., 2001].
200. *Arapea oblonga* (Haworth, 1809): Волн., Горл., Дим., Дон., К. М., Х. С. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002]; 1♀, Бр., 22.07.1996 (Сова).
201. *Arapea remissa* (Hübner, [1809]): В. Ан., Волн., Х. С. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2005]; 1♂, Бр., 15.05.2005 (Сова).
202. *Arapea anceps* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Арт. [Ключко и др., 2001]; 1♂, Кр., 18.06.1937 (Бундель) (ЗИН); 2 экз., Бр., 27.05.2005, 9.07.2006 (Сова).
203. *Arapea sordens* (Hufnagel, 1766): Арт., В. Ан., Волн., К. М., Х. С. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002, 2005]; 1♀, Бр., 28.05.2005 (Сова); 1 экз., Ясин., 06.2001 (Северов).
204. *Arapea ferrago* (Eversmann, 1837): К. М. [Ключко и др., 2001].
205. *Arapea scolopacina* (Esper, [1788]): 1 экз., К. М., 9.07.1991 [Бидзиля и др., 2001].
206. *Leucarapea ophiogramma* (Esper, [1794]): 1 экз., Х. С., 2-4.07.2001 (Рутьян) [Ключко, Шешурак, 2002].
- *207. *Eremobina pabulatricula* (Brahm, 1791): 1♂, Бр., 9.07.2006 (Сова). Ближайшие местонахождения — Харьков и Чугуевский р-н Харьковской обл. [Ключко и др., 2001].
208. *Oligia strigilis* (Linnaeus, 1758): Дрон., Крам. [Ключко и др., 2001]; 1♂, 1♀, Ясн., 18.06.1937 (Бундель) (ЗИН).
209. *Oligia latruncula* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Арт., В. Ан., Дон., Дрон., К. М., Х. С. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002, 2005].
210. *Mesoligia furuncula* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Арт., Дим., Зак., К. М., Ниж., Слав., Х. С., Ч. Яр., Яцк. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002]; 2 экз., Мар., 25.08.2005 (Ботман).
211. *Mesarapea secalis* (Linnaeus, 1758): Слав., Ст. [Ключко и др., 2001]; 2 экз., Дон., 16.07.1992, 4.08.2006 (Сова).
212. *Mesarapea didyma* (Esper, 1788): К. М. [Ключко, 1995].
- *213. *Luperina testacea* ([Denis & Schiffermüller], 1775): 1 экз., Мар., 25.08.2005 (Ботман).
214. *Luperina taurica* (Kljutschko, 1967): Х. С. [Kljutschko, 1970].
215. *Sidemia spilogramma* (Rambur, 1871): Арт. [Ключко и др., 2001].
216. *Amphipoea osculea* (Linnaeus, 1761): Волн., Слав. [Ключко и др., 2001].
217. *Amphipoea fucosa* (Freyer, 1830): Арт., В. Ан., Вел., Зак., К.М., Пр., Слав., Сн., Удач., Х. С., Ч. Яр., Яцк. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002]; 1♂, Бр., 20.07.1996 (Сова) (опр. Ключко); 1♀, Ясин., 20.06.2000 (Северов) (опр. Матов).
218. *Amphipoea lucens* (Freyer, 1845): Слав. [Ключко и др., 2001].
219. *Hydraecia micacea* (Esper, [1789]): К. М., Ст. [Ключко, 1995; Ключко и др., 2001]; 1 экз., Бр., 24.07.1995 (Сова).
220. *Hydraecia osseola* (Staudinger, 1882): Арт., В. Ан., Волн., Х. С. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002].
221. *Gortyna flavago* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Арт., Вел., Х. С. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002, 2005]; 1 экз., В. Ан., 1.10.2000 (Пак).

222. *Gortyna cervago* Eversmann, 1844: Волн., К. М., Х. С. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002].
223. *Helotropha leucostigma* (Hübner, [1808]): Арт., Волн., Х. С. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002]; 2 экз., Бр., 7-8.08.2005 (Сова).
224. *Calamia tridens* (Hufnagel, 1766): Арт., Волн., Дим., К. М., Ниж., Х. С., Ч. Яр [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002]; 1 экз., Бр., 2.06.1996 (Сова); 1 экз., Мар., 1999; 2 экз., Укр., 17-19.07.2007 (Ботман).
- *225. *Staurophora celsia* (Linnaeus, 1758): 1♂, В. Ан., 1.10.2000 (Пак). Внесен в Червону книгу України (1994).
226. *Chortodes fluxa* (Hübner, [1809]): Арт., Волн., Дрон., Х. С. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002].
227. *Oria musculosa* (Hübner, [1808]): Арт., Волн., Дон., Мар. [Ключко и др., 2001].
228. *Nonagria typhae* (Thunberg, 1784): Арт., К. М. [Бидзиля и др., 2001; Ключко и др., 2001]; 1 экз., Бр., 27.07.1995 (Сова).
229. *Rhizedra lutosa* (Hübner, [1803]): Арт., К. М., Х. С. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002]; 1 экз., Мар., 12.10.2005; 1 экз., Наб., 8.10.2005 (Ботман).
230. *Archanara geminipuncta* (Haworth, 1809): Арт., В. Ан., К. М., Х. С. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002]; 3 ♀♀, Дон., 27-29.07.2006 (Сова).
231. *Archanara neurica* (Hübner, [1808]): К. М., Х. С. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002].
232. *Archanara dissoluta* (Treitschke, 1825): Арт., Волн., Дрон., К. М., Х. С. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002]; 1 экз., Бр., 18.07.2005 (Сова).
233. *Archanara sparganii* (Esper, [1790]): Арт., К. М., Х. С. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002]; 7 экз., Бр., 26-27.07.1997, 1♂, 1♀, там же, 25.07-3.08.2006 (Сова); 1 экз., Мар., июль 2000 (Ботман).
234. *Archanara algae* (Esper, [1789]): Волн., Х. С. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002].
235. *Sedina buettneri* (E.Hering, 1858): К. М. [Бидзиля и др., 2001]; 1 экз., Бр., 9.05.1996 (Сова).
236. *Arenostola phragmitidis* (Hübner, [1803]): Волн., К. М., Х. С. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002].
237. *Episema glaucina* (Esper, 1789): В. Ан., К. М., Х. С. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002].
238. *Episema lederi* Christoph, 1885: Х. С. [Ключко и др., 2001].
239. *Ulochlaena hirta* (Hübner, [1813]): В. Ан., Волн., К. М., Х. С. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002]; 1 экз., Черм., 14.10.2007 (Ботман).
240. *Parastichtis suspecta* (Hübner, [1817]): Яцк. [Ключко и др., 2001].
241. *Apterogenum ypsilon* ([Denis & Schiffermüller], 1775): В. Ан., Дрон., К. М., Х. С. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002, 2005]; 2 экз., Бр., 2.08.2005, 9.07.2006 (Сова).
242. *Atypha pulmonaris* (Esper, [1790]): Арт. [Ключко и др., 2001].
243. *Tiliacea citrigo* (Linnaeus, 1758): Арт. [Ключко и др., 2001].
244. *Cirrhia icteritia* (Hufnagel, 1766): Дим., Дон., К. М., Х. С. [Kljutschko, 1970; Ключко и др., 2001]; 2 экз., Бр., 22.09.1985 (Сова).
245. *Cirrhia gilvago* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Арт., К. М., Х. С., Ясн. [Ключко и др., 2001]; 1 экз., Мар., 1998 (Ботман).
246. *Cirrhia ocellaris* (Borkhausen, 1792): Арт., Дон. [Ключко и др., 2001]; 1 экз., Дон., 26.09.2003 (Пак); 1 экз., Мар., 8.10.2006 (Ботман); 2 экз., Тор., 22.09.2009 (Коновалов).
247. *Agrochola lychnidis* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Дон. [Ключко и др., 2001].
248. *Agrochola litura* (Linnaeus, 1758): Дон. [Ключко и др., 2001]; 1 экз., Мар., 1999 (Ботман).
249. *Agrochola helvola* (Linnaeus, 1758): Арт., Дон. [Ключко и др., 2001].
250. *Agrochola lota* (Clerck, 1759): Х. С. [Kljutschko, 1970]; 1 экз., Тор., 27.09.2006 (Коновалов).
251. *Agrochola macilenta* (Hübner, [1809]): Арт., К. М. [Ключко, 1995; Ключко и др., 2001]; 1 экз., В. Ан., 1.10.2000 (Пак).
252. *Agrochola circellaris* (Hufnagel, 1766): Арт., В. Ан., Дон., К. М., Х. С. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002]; 1 экз., Дон., 26.10.2004 (Пак); 2♂♂, 1♀, Кр., Ясн. 7.09.1937 (Бундель); 1 экз., Мар., 22.10.2006 (Ботман); 2 экз., Тор., 18-23.09.2006 (Коновалов).
253. *Agrochola laevis* (Hübner, [1803]): Яцк. [Ключко и др., 2001]; 2♂♂, 8♀♀, Кр., Ясн., 7.09.1937 (Бундель) (ЗИН).
254. *Conistra vaccinii* (Linnaeus, 1761): Арт., В. Ан., Волн., К. М., Х. С. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002]; 1♂, Брус., 20.09.1937 (Бундель) (ЗИН); 1 экз., Мар., 23.03.2006 (Ботман).

255. *Conistra rubiginosa* (Scopoli, 1763): Арт. [Ключко и др., 2001]; 6 экз., Мар., 8.11.2005, 1-15.04.2006, 20.02.2007, лёт с октября по апрель (Ботман).
256. *Conistra veronicae* (Hübner, [1813]): Х. С. [Kljutschko, 1970].
257. *Conistra erythrocephala* ([Denis & Schiffermüller], 1775): 1♀, В. Ан., 1.10.2000 (Пак); 1♂, 1♀, Кр., Ясн., 7.09.1937 (Бундель) (ЗИН) [Ключко, Матов, 2005].
258. *Lithophane ornitorus* (Hufnagel, 1766): Арт. [Ключко и др., 2001].
259. *Xylena exsoleta* (Linnaeus, 1758): К. М. [Ключко и др., 2001].
260. *Xylena vetusta* (Hübner, [1813]): Арт. [Ключко и др., 2001].
261. *Eupsilia transversa* (Hufnagel, 1766): Арт., В. Ан., Волн., Дон., Х. С. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002].
262. *Gripesia aprilina* (Linnaeus, 1758): Яцк. [Ключко и др., 2001]; 1♀, В. Ан., 1.10.2000 (Пак).
- *263. *Antitype chi* (Linnaeus, 1758): 1♂, В. Ан., 1.10.2000 (Пак).
264. *Ammoconia caecimacula* ([Denis & Schiffermüller], 1775): К. М., Х. С. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002]; 1 экз., Мар., 31.08.2005 (Ботман).
265. *Dasyptolia templi* Thunberg, 1792: Арт., К. М., Х. С. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002]; 1♂, 1♀, Мар., январь 2004; 1 экз., там же, октябрь 2003 (Ботман).
- *266. *Polymixis trisignata* (Ménétrières, 1848): В. Ан., Волн., Дим., Х. С. [Ключко, 1993; Ключко и др., 2001]; а также 1♂, г.Соледар Луганской обл., 09.2002 (Северов). Вид впервые отмечен в Донецкой и Луганской обл., к нему принадлежат бабочки, определенные ранее как *Mniotype leuconota* (Herrich-Schäffer, 1850) [Блёкер, Кавригин, 1898; Ключко, 1993, 2005; Ключко и др., 2001, 2006].

Подсемейство Hadeninae

267. *Orthosia incerta* (Hufnagel, 1766): Арт., В. Ан., Волн., Дон., Крам., Х. С. [Ключко и др., 2001]; 3 экз., Бр., 1-11.05.1996, 10.09.1996 (Сова); 21 экз., Мар., 26.03.2006, 6-26.04-8.05.2007 (Ботман).
268. *Orthosia miniosa* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Крам. [Ключко и др., 2001]; 1♂, Кр., 8.04.1937; 1♂, Брус., 10.04.1937 (Бундель) (ЗИН).
269. *Orthosia cerasi* (Fabricius, 1775): Крам. [Ключко и др., 2001]; 1 экз., Мар., 26.04.2007 (Ботман).
270. *Orthosia cruda* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Арт., Крам. [Ключко и др., 2001]; 1♂, 1♀, Кр., 10-20.04.1937 (Бундель) (ЗИН); 5 экз., Мар., 14-17.04.2006, 6-26.04.2007 (Ботман).
271. *Orthosia populeti* (Fabricius, 1781): Дон., Крам. [Ключко и др., 2001]; 1 экз., Мар., 6.04.2007 (Ботман).
272. *Orthosia gracilis* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Арт., К. М., Слав., Х. С. [Ключко и др., 2001]; 5 экз., Бр., 1-11.05.1996 (Сова).
273. *Orthosia opima* (Hübner, [1809]): Х. С. [Ключко и др., 2001].
274. *Orthosia gothica* (Linnaeus, 1758): Арт., К. М., Карл., Х. С. [Ключко и др., 2001]; 1 экз., Бр., 9.05.1996 (Сова).
275. *Anorthoa munda* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Арт., Волн., Крам. [Ключко и др., 2001]; 1♂, Кр., 10.04.1937 (Бундель) (ЗИН); 1 экз., Мар., 1999 (Ботман).
276. *Egira conspicillaris* (Linnaeus, 1758): Волн., Горл., Дон. [Ключко и др., 2001]; 1♀, 26.04.2007 и 1♂, 8.05.2007, Мар. (Ботман).
277. *Egira anatolica* (Hering, 1933): Волн., К.М., Ст., Х. С. [Ключко, 1998; Ключко и др., 2001]; 2♀♀, Бр., 8-9.05.1996 (Сова); 1♂, Мар., 7.05.2006 (Ботман).
278. *Tholera cespitis* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Зак., Х. С. [Ключко и др., 2001].
279. *Tholera decimalis* (Poda, 1761): Арт., Дон., К. М., Х. С. [Ключко и др., 2001]; 1 экз., Мар., 28.08.2007 (Ботман).
- *280. *Anarta odontites* (Boisduval, 1829): 1♂, В. Ан., 4.06.1968 (Лисецкий). Впервые отмечен в Донецкой обл. и левобережной Украине.
281. *Anarta dianthi* (Tauscher, 1809): В. Ан., Дон., К. М., Ст., Х. С. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002, 2005].

282. *Anarta trifolii* (Hufnagel, 1766): повсеместно [Ключко и др., 2001; Ключко, 2005].
283. *Anarta stigmata* (Christoph, 1887): Арт., В. Ан., Х. С. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2005]; 1♂, Бр., 27.07.2005 (Сова).
284. *Cardepija hartigi* (Parenzan, 1981): В. Ан., Х. С. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2005].
- *285. *Cardepija helix* Boursin, 1962: 1♂, Бр., 9.07.2006 (Сова) (опр. Ключко).
286. *Polia bombycina* (Hufnagel, 1766): Арт., В. Ан., Волн., К. М., Х. С., Яцк. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002, 2005]; 1♀, Дон., 26.06.2006 (Сова).
- *287. *Polia hepatica* (Clerck, 1759): 1 экз., К. М., 27.06.2001 (Рутьян); 1♀, Бр., 4.08.2006 (Сова).
- *288. *Polia nebulosa* (Hufnagel, 1766): В. Ан. [Ключко, 2005].
289. *Polia serratilinea* (Ochsenheimer, 1816): Дрон. [Ключко и др., 2001].
290. *Pachetra sagittigera* (Hufnagel, 1766): К. М., Х. С. [Ключко и др., 2001].
291. *Lacanobia w-latinum* (Hufnagel, 1766): Арт., В. Ан., Дон., Дрон., К. М., Х. С. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002, 2005]; 5 экз., Бр., май 2002 (Сова); 1 экз., Мар., 9.06.2006 (Ботман).
292. *Lacanobia thalassina* (Hufnagel, 1766): Арт., Волн., Дрон., Х. С. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002]; 3 экз., Бр., 3.05.1996, 19.07.1996 (Сова).
293. *Lacanobia suasa* ([Denis & Schiffermüller], 1775): повсеместно [Ключко и др., 2001; Ключко, 2005].
294. *Lacanobia oleracea* (Linnaeus, 1758): повсеместно [Ключко и др., 2001; Ключко, 2005].
295. *Lacanobia splendens* (Hübner, [1808]): Волн., Х. С. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002].
296. *Lacanobia aliena* (Hübner, [1809]): В. Ан., Горл., К. М. [Ключко и др., 2001].
297. *Lacanobia blenna* (Hübner, [1824]): Арт., К. М., Крам., Х. С. [Ключко и др., 2001].
298. *Lacanobia praedita* (Hübner, [1813]): Х. С. [Ключко и др., 2001].
299. *Melanchra persicariae* (Linnaeus, 1761): повсеместно [Ключко и др., 2001].
300. *Hypobarathra icterias* (Eversmann, 1843): К. М. [Ключко и др., 2001].
301. *Hada plebeja* (Linnaeus, 1761): окр. Крам. [Ключко и др., 2001]; 2 экз., Бр., 28.05.2005, 20.07.1996 (Сова).
302. *Hyssia cavernosa* (Eversmann, 1842): Арт., Дим., К. М. [Ключко и др., 2001].
303. *Mamestra brassicae* (Linnaeus, 1758): повсеместно [Ключко и др., 2001; Ключко, 2005].
304. *Sideridis turbida* (Esper, [1790]): Арт., В. Ан., Горл., К. М., Х. С. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2001, 2005].
305. *Sideridis egena* (Lederer, 1853): Арт., Горл., Дон., Зак., Ниж., Х. С. [Ключко и др., 2001].
306. *Sideridis rivularis* (Fabricius, 1775): Горл., К. М., Х. С., Яцк. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002]; 1 экз., Бр., 28.05.2005 (Сова).
307. *Sideridis reticulata* (Goeze, 1781): Арт., В. Ан., Дрон., К. М., Крам., Х. С. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2005]; 1 экз., Дон., 19.06.2004 (Сова). Указание близкого вида *Sideridis kitti* (Schawerda, 1914) в заповеднике «Каменные Могилы» основано на неточном определении.
308. *Sideridis implexa* (Hübner, [1809]): К. М., Х. С. [Ключко и др., 2001].
309. *Saragossa siccanorum* (Staudinger, 1870): Х. С. [Ключко и др., 2001].
310. *Saragossa porosa* (Eversmann, 1854): К. М., Х. С. [Ключко и др., 2001]; 1 экз., Бр., 26.07.1996 (Сова).
311. *Conisania luteago* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Арт., В. Ан., Волн., Дон., К. М., Х. С. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2005]; 1♀, Бр., 9.07. 2006 (Сова) (опр. Ключко).
312. *Hecatera bicolorata* (Hufnagel, 1766): Дон., К. М., Яцк. [Бидзиля и др., 2001; Ключко и др., 2001]; 3 экз., Бр., 28.05.2005, 25-26.07.1997 (Сова).
313. *Hecatera dysodea* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Арт., В. Ан., Волн., К. М., Х. С., Яцк. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002, 2005]; 1 экз., Бр., 27.07.2005 (Сова).
314. *Hecatera cappa* (Hübner, [1809]): Зак., К. М., Ст., Ч. Яр [Ключко и др., 2001]; 2 экз., Мар., 25.09.2005, 26.09.2006 (Ботман).
315. *Enterpia laudeti* (Boisduval, 1840): Х. С. [Ключко и др., 2001].
316. *Hadena capsicola* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Арт., К. М., Х. С., Яцк. [Kljutschko, Hacker, 1996; Ключко и др., 2001]; 3 экз., Бр., 28.05.2005, 20-23.07.1997 (Сова).
317. *Hadena magnoliae* (Boisduval, 1829): Ст. [Ключко и др., 2001].
318. *Hadena compta* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Арт., В. Ан., К. М., Х. С. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2005]; 2 экз., Бр., 26.07.1997, 8.08.2005 (Сова).

319. *Hadena albimacula* (Borkhausen, 1792): К. М., Х. С., Яцк. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002]; 1 экз., Бр., 5.08.2005 (Сова).
320. *Hadena vulcanica* (Turati, 1907) ssp. *urumovi* (Drenowski, 1931): Арт., В. Ан., К. М., Х. С. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002, 2005].
321. *Hadena persimilis* Hacker, 1996: К. М., Х. С. [Kljutschko, Hacker, 1996; Ключко и др., 2001].
322. *Hadena filograna* (Esper, [1788]): Горл. [Alberti, Soffner, 1962].
323. *Hadena drenowskii* (Rebel, 1930) ssp. *lapidea* Kljutschko & Hacker, 1996: К. М., Х. С. [Ключко и др., 2001].
324. *Hadena perplexa* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Ст., Х. С. [Ключко и др., 2001]; 2 ♂♂, Дон., 1-5.07.2006 (Сова) (опр. Ключко).
325. *Hadena irregularis* (Hufnagel, 1766): Дон., К. М., Курд., Х. С. [Ключко и др., 2001]; 2 экз., Мар., 24.08.2007 (Ботман).
326. *Hadena syriaca* (Osthelder, 1933) ssp. *podolica* (Kremky, 1937): Арт., К. М., Ниж., Ст., Х. С. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002]; 1♀, Дон., 26.06.2006 (Сова) (опр. Ключко).
327. *Hadena christophi* (Möschler, 1862): Х. С. [Ключко и др., 2001].
328. *Hadena scythia* Kljutschko & Hacker, 1996: Арт., Х. С. [Ключко и др., 2001]. Бабочка поймана также в северной части Арабатской стрелки (сборщик А.А.Солодовников, сообщил А.Ю.Матов).
- *329. *Hadena tephroleuca* (Boisduval, 1833) ssp. *asiatica* (F.Wagner, 1931): 1♀, В. Ан, 1.06.1968 (Лицецкий) [Ключко, 2005].
330. *Mythimna pudorina* ([Denis & Schiffermüller], 1775): К. М., Ст., Х. С. [Ключко и др., 2001].
331. *Mythimna conigera* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Дрон., К. М., Яцк. [Ключко и др., 2001]; 4 экз., Бр, 24.07-8.08.2005, 1 экз., 28.06.1998 (Сова).
332. *Mythimna pallens* (Linnaeus, 1758): повсеместно [Ключко и др., 2001; Ключко, 2005].
- *333. *Mythimna impura* (Hübner, 1808): 1 экз., Бр., 8.08.2005 (Сова).
334. *Mythimna vitellina* (Hübner, [1808]): К. М., Х. С. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2002]; 1♂, В. Ан., 1.10.2000 (Пак); 2 экз., Мар., 25.08.2005 (Ботман).
335. *Mythimna alopecuri* (Boisduval, 1840): Волн., К. М., Х. С. [Ключко и др., 2001].
336. *Mythimna anderreggii* (Boisduval, 1840): К. М., Х. С. [Ключко и др., 2001].
337. *Mythimna sicula* (Treitschke, 1835): К. М. [Ключко и др., 2001].
338. *Mythimna albipuncta* ([Denis & Schiffermüller], 1775): повсеместно [Ключко и др., 2001; Ключко, 2005].
339. *Mythimna ferrago* (Fabricius, 1787): Арт., К. М., Пр., Слав., Х. С. [Ключко и др., 2001]; 4 экз., Мар., 19-31.08.2005 и 24.08.2007 (Ботман); 3 экз., Бр., 15.05.2005, 2.06.1996, 29.07.1995 (Сова).
340. *Mythimna l-album* (Linnaeus, 1767): повсеместно [Ключко и др., 2001; Ключко, 2005].
341. *Leucania obsoleta* (Hübner, [1803]): Арт., В. Ан., Волн., Горл., К. М., Крам., Х. С. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2005]; 3 экз., Бр., 15.05.2005, 15.07.1996, 28.07.2005 (Сова); 1♀, Мар., 11.05.2007 (Ботман).
342. *Senta flammea* (Curtis, 1828): К. М., Х. С. [Ключко и др., 2001 ; Ключко, 2002].

Подсемейство Noctuidae

343. *Peridroma saucia* (Hübner, [1808]): Арт., К. М. [Ключко и др., 2001].
344. *Dichagyris vallesiaca* (Boisduval, [1837]): Кр. Л. [Ключко и др., 2001].
345. *Dichagyris signifera* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Арт., Горл. [Ключко и др., 2001]; 1♀, Бр., 16.04.2004 (Сова).
346. *Dichagyris orientis* (Alphéraky, 1882) ssp. *pseudosignifera* (Boursin, 1952): Яцк. [Ключко и др., 2001]; 1♀, Бр., 9.07.2006 (Сова) (опр. Ключко).
347. *Euxoa conspicua* (Hübner, 1827) (= *agricola* (Boisduval, 1829): Дон., Мар. [Ключко и др., 2001].
348. *Euxoa temera* (Hübner, [1808]): К. М., Х. С. [Ключко и др., 2001]; 1♀, Мар., 25.08.2006 (Ботман).

349. *Euxoa distinguenda* (Lederer, 1857): Арт., Крам., Ниж., Мар., Х. С. [Ключко и др., 2001]; 1♂, 1♀, Бр., 28.05.2005 и 26.07.1997 (Сова) (опр. Матов).
350. *Euxoa obelisca* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Арт., В. Ан., Крам., Х. С., Ясн. [Ключко и др., 2001]; 1♂, Мар., 25.08.2006 (Ботман); 1♂, К.М., 8.06.1997 (Пак) (опр. Матов) (Ключко, Матов, 2006).
351. *Euxoa montivaga* Fibiger, 1997: Арт. [Ключко и др., 2001].
- *352. *Euxoa eruta* (Hübner, [1827]): 1♂, Яцк., 8.07.1998 (Пак) (опр. Матов).
353. *Euxoa nigrofusca* (Esper, [1788]): Яцк. [Ключко и др., 2001].
354. *Euxoa tritici* (Linnaeus, 1761): Арт., Волн., Зак., Мар. [Ключко и др., 2001]; 1♂, Бр., 28.05.2005 (Сова) (опр. Матов).
355. *Euxoa nigricans* (Linnaeus, 1761): Горл. [Alberti, Soffner, 1962].
356. *Euxoa aquilina* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Арт., Горл., К. М., Х. С. [Ключко и др., 2001].
357. *Euxoa basigramma* (Staudinger, 1870): окр. Сн. [Ключко и др., 2001].
358. *Euxoa recussa* (Hübner, [1817]): Крам. [Ключко и др., 2001].
359. *Agrotis bigramma* (Esper, [1790]): Вел., Волн., Дон., Зак., К. М., Ниж., Пр., Х. С., Ч. Яр. [Ключко и др., 2001]; 2 экз., Мар., 9.09.2005 (Ботман); 3 экз., Бр., 15.07-17.08.1996, 1 экз., там же, 26.07.1997, 1 экз., 28.05.2005 (Сова).
360. *Agrotis obesa* Boisduval, 1829: Арт., Х. С. [Ключко и др., 2001].
361. *Agrotis cinerea* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Арт., Волн., К. М., Сн., Х. С. [Ключко и др., 2001].
362. *Agrotis exclamatoris* (Linnaeus, 1758): повсеместно [Ключко и др., 2001; Ключко, 2005].
363. *Agrotis segetum* ([Denis & Schiffermüller], 1775): повсеместно [Ключко и др., 2001; Ключко, 2005].
364. *Agrotis vestigialis* (Hufnagel, 1766): Арт., Волн., Х. С. [Ключко и др., 2001].
365. *Agrotis desertorum* Boisduval, 1840: Арт., Волн., К. М. [Ключко и др., 2001].
- *366. *Agrotis trux* (Hübner, [1824]): 1♀, окр. Мар., 25.08.2005 (Ботман). Средиземноморский вид, Мариуполь представляет одно из северо-восточных местонахождений [Fibiger, 1990].
- *367. *Agrotis puta* (Hübner, [1803]): 2 экз., Дон., 2.06.2005; 1 экз., Бр., 10.08.2005 (Сова).
368. *Agrotis ipsilon* (Hufnagel, 1766): повсеместно [Ключко и др., 2001; Ключко, 2005].
369. *Axylia putris* (Linnaeus, 1761): повсеместно [Ключко и др., 2001; Ключко, 2005].
370. *Ochropleura plecta* (Linnaeus, 1761): Кр. Л., Арт. [Ключко и др., 2001]; 8 экз., Бр., 28.05.2005, 25.07.2005, 5.08.2005 (Сова).
371. *Diarsia rubi* (Vieweg, 1790): Арт., Волн. [Ключко, 1988].
372. *Diarsia florida* (Schmidt, 1859): Нов., Ст. [Ключко и др., 2001]; 1 экз., Бр., 06.2005 (Сова).
373. *Cerastis rubricosa* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Арт., К. М., Х. С. [Ключко и др., 2001].
374. *Paradiarsia punicea* (Hübner, [1803]): Волн. [Ключко, 1988].
375. *Rhyacia simulans* (Hufnagel, 1766): Волн. [Ключко и др., 2001].
376. *Rhyacia arenacea* (Hampson, 1907): Арт., В. Ан., К. М., Х. С., Ч. Яр [Ключко и др., 2001; Ключко, 2005].
377. *Chersotis rectangula* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Крам. [Ключко и др., 2001].
378. *Chersotis elegans* (Eversmann, 1837): Арт., К. М. [Ключко и др., 2001].
379. *Noctua pronuba* (Linnaeus, 1758): К. М., Х. С. [Ключко и др., 2001]; 2 экз., Дон., 23.06.1978, 15.08.1998 (Сова); 1 экз., Мар., июнь 2000 (Ботман); 1 экз., Тор., 23.06.2002 (Коновалов).
380. *Noctua fimbriata* (Schreber, 1759): В. Ан., К. М., Х. С. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2005]; 1♂, Кр., 7.09.1937 (Бундель) (ЗИН); 1 экз., Мар., 31.08.2005 (Ботман); 1 экз., Бр., 8.07.1996 (Сова).
381. *Noctua orbona* (Hufnagel, 1766): К. М., Х. С. [Ключко и др., 2001]; 1 экз., Мар., июнь 2000 (Ботман).
382. *Noctua interposita* (Hübner, [1790]): Арт., Дон., К. М. [Ключко и др., 2001]; 1 экз., Мар., 25.08.2005 (Ботман).
383. *Noctua comes* (Hübner, [1813]): К. М. [Ключко и др., 2001].
- *384. *Noctua janthina* ([Denis & Schiffermüller], 1775): 1 экз., Бел., август 1998 (Ботман).
385. *Spaelotis ravidia* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Арт., В. Ан., Горл., Х. С. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2005].

386. *Opigena polygona* ([Denis & Schiffermüller], 1775): К. М. [Ключко и др., 2001].
- *387. *Anaplectoides prasina* ([Denis & Schiffermüller], 1775): 1 ♂, Бр., 27.07.2005 (Сова).
388. *Xestia baja* ([Denis & Schiffermüller], 1775): В. Ан., МарЛ. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2005].
389. *Xestia stigmatica* (Hübner, [1813]) (= *rhomboidea* sensu auct., nec Esper, 1790): Арт., Горл. [Ключко и др., 2001].
390. *Xestia xanthographa* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Дон., К. М., Ст., Х. С. [Ключко и др., 2001]; 1 экз., Мар., 9.09.2005, 2 экз., 21.09.2006 (Ботман).
391. *Xestia cohaesa* (Herrich-Schäffer, [1849]): Ст., К. М. [Ключко и др., 2001]; 1 экз., Тор., 20.09.2006 (Коновалов) (опр. Матов).
392. *Xestia c-nigrum* (Linnaeus, 1758): повсеместно [Ключко и др., 2001].
393. *Xestia ditrapezium* ([Denis & Schiffermüller], 1775): Арт. [Ключко, 1988].
394. *Xestia triangulum* (Hufnagel, 1766): В. Ан., Горл., К. М., Крам., Х. С. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2005].
395. *Xestia ashworthii* (Doubledau, 1855): Яцк. [Ключко и др., 2001].
396. *Eugraphe sigma* ([Denis & Schiffermüller], 1775): В. Ан., Горл. [Ключко и др., 2001; Ключко, 2005].
397. *Eugnorisma depuncta* (Linnaeus, 1761): Арт. [Ключко и др., 2001]; 1 ♀, Кр., 7.09.1937 (Бундель) (ЗИН).
398. *Naenia typica* (Linnaeus, 1758): Крам., Х. С. [Ключко и др., 2001].

В Донецкой области в настоящее время зарегистрированы 398 видов совок, в том числе в заповедниках «Хомутовская Степь» — 231, «Каменные Могилы» — 230 [Kljutschko, 1970; Ключко, 2001(2002); Бидзиля и др., 2001; Ключко, Матов, 2006], заказнике «Великоанадольский Лес» — 160 видов [Ключко, 2005].

Таксономическая структура фауны чешуекрылых заповедника «Каменные Могилы» оказалась достаточно сложной [Бидзиля и др., 2001], здесь обнаружены представители 60 семейств (1085 видов из 590 родов). При этом совки оказались первыми среди ведущих семейств чешуекрылых — процент входящих в семейство видов фауны составляет около 20,8.

Довольно беден видовой состав совок в нескольких изученных урбоценозах: в Донецке найдены 90, в Мариуполе 105, в Краматорске и окрестностях (Ясногорка, Краматорская) — 73, в Славяногорске — 44 вида. В пригородах, например, в с. Брусовка близ Красного Лимана, обнаружены 112 видов. Более разнообразен состав совок, собранных в местах отдыха, например в г. Артемовск и его окрестностях (п. Ступки и с. Дроновка Артемовского р-на) — 211 видов. Обращает на себя внимание почти полное отсутствие в урбоценозах степных и отчасти лугово-степных видов. Несомненно, список видов совок, обитающих в названных и других пунктах, а также в Донецкой области в целом в дальнейшем будет увеличен.

В соседней Луганской области насчитывается 438 видов совок [Ключко, Шешурак, 2005; Ключко, Матов, Северов, 2006; Ключко, Северов, в печати]. При сравнении видовой состава совок Донецкой и Луганской областей отметим высокую степень сходства их фаун — 352 общих вида, более 72,7% по формуле Жаккара, почти 0,84 по формуле Сьеренсена. Эти показатели свидетельствуют об общем происхождении фауны совок Донбасса. Как одну из причин сходства фауны совок Луганской и Донецкой областей, укажем, что в обеих областях наиболее разнообразными по видовому составу оказались сборы в долине среднего течения Северского Донца (практически на смежных территориях). Заметно отличаются по биоразнообразию совок сборы в степных заповедниках.

В настоящее время в Донбассе зарегистрированы 484 вида совок, то есть по биоразнообразию семейства этот регион не уступает Крыму [Ключко, 2006; Будашкин и др., 2006].

Список совок сопредельной Ростовской области включает 409 видов [Poltavsky, Nekrasov, 2002; Полтавский и др., 2004; Poltavsky et al., 2007], что вполне сравнимо с количеством видов в Донецкой области. Общими для этих областей являются 287 видов, коэффициент общности фауны достигает 57,3% по формуле Жаккара, или 0,72 по формуле Сьеренсена.

Благодарности. Автор искренне благодарна А.В. Бидзиле, Р.В. Ботману, А.В. Жакову, С.В. Коновалову, И.Ю. Костюку, О.В. Паку, Е.В. Рутьяну, П.Н. Шешураку, И.Г. Плющу, И.Г. Северову, Ю.Ф. Сове, передавшим свои сборы совок в Донецкой области для идентификации, также А.Ю. Матову за содействие в работе с фондовыми коллекциями Зоологического института РАН и переопределение некоторых сложных видов.

Литература

- Бартенев А.Ф., Грамма В.Н. 1996. К изучению насекомых и других членистоногих из Красной книги Украины // Изв. Харьков. энтомол. об-ва. Т.4, вып. 1-2. С.14-18.
- Блэкер Г., Кавригин В. 1898. *Lepidoptera* // Зоол. Иссл. Лесн. Департ. / Тр. Эксп. Лесн. Департ., Научн. отд. Т.IV, вып.2, прилож. С. 30-38.
- Бидзиля А.В., Будашкин Ю.И., Жаков А.В., Ключко З.Ф., Костюк И.Ю. 2001. Фауна чешуекрылых (*Lepidoptera*) заповедника «Каменные могилы» и ее таксономическая структура // Карадаг. История, биология, археология. Сб. науч. тр., посвященный 85-летию Карадагской биол. станции им. Т.И. Вяземского. Симферополь: «СОНАТ». С.72-107.
- Будашкин Ю.И., Матов А.Ю., Ключко З.Ф. 2006. Материалы к ревизии списка совок (*Lepidoptera*, *Noctuidae*) Крымского полуострова // Экосистемы Крыма, их оптимизация и охрана. Тематический сб. науч. тр. Вып. 16. Симферополь: ТНУ. С. 62-72.
- Ключко З.Ф. 1978. Совки квадрифиоидного комплекса. Киев: Наук. Думка. 412 с. (Фауна України. Т.16, вып. 6).
- Ключко З.Ф. 1980. К изучению четырех пар видов-двойников у совок (*Lepidoptera*, *Noctuidae*) // Вестн. зоол. №4. С.20-24.
- Ключко З.Ф. 1988. Систематический список совок подсемейства *Noctuinae* фауны УССР (*Lepidoptera*, *Noctuidae*) // Экология и таксономия насекомых Украины. Киев: Наук. думка. С.80-90.
- Ключко З.Ф. 1995. Систематический список совок подсемейства *Cuculliinae* (*Lepidoptera*, *Noctuidae*) фауны Украины // *Actias. Russian J. Sci. Lepid.* Vol. 1(1-2). С. 37-43.
- Ключко З.Ф. 1995. Совки (*Lepidoptera*, *Noctuidae*) заповедника «Каменные могилы» // Изв. Харьков. энтомол. об-ва. Т.3, вып. 1-2. С.7-13.
- Ключко З.Ф. 1998. К изучению новых и малоизвестных совок (*Lepidoptera*, *Noctuidae*) фауны Украины // Ж. Укр. ентом. т-ва. Т.4 (3-4). С.17-23.
- Ключко З.Ф. 2001(2002). Обзор совок (*Lepidoptera*, *Noctuidae*) степных заповедников Украины // Изв. Харьков. энтомол. об-ва. Т.9, вып. 1-2. С. 114-122.
- Ключко З.Ф. 2003. Новые и малоизвестные виды совок (*Lepidoptera*, *Noctuidae*) фауны Украины // Вестн. зоол. Т. 37, №1. С. 100.
- Ключко З.Ф. 2005. К изучению совок (*Lepidoptera*: *Noctuidae*) заказника «Великоанадольский лес» (Украина, Донецкая область) // Эверсманния. Вып. 2. С. 27-32.
- Ключко З.Ф. 2006. Совки України. Київ: Вид-во Раєвського. 248 с.
- Ключко З.Ф., Ботман Р.В. 2007. *Catocala neonympa* — новый для фауны Донбасса вид ленточниц (*Lepidoptera*, *Noctuidae*, *Catocalinae*) // Вестн. зоол. Т.41, №4. С. 342.
- Ключко З.Ф., Будашкин Ю.И., Герасимов Р.П. 2004. Новые и малоизвестные виды совок (*Lepidoptera*) фауны Украины // Вестн. зоол. Т.38, №1. С. 94.
- Ключко З.Ф., Матов А.Ю. 2005. Новые и малоизвестные виды совок (*Lepidoptera*, *Noctuidae*) фауны Украины // Вестн. зоол. Т. 39, №1. С. 86.
- Ключко З.Ф., Матов А.Ю. 2006. Новые находки некоторых видов совок (*Lepidoptera*, *Noctuidae*) фауны Украины // Вестн. зоол. Т. 40, №5. С. 416.
- Ключко З.Ф., Матов А.Ю. 2007. Новые и малоизвестные виды совок (*Lepidoptera*, *Noctuidae*) фауны Украины // Вестн. зоол. Т. 41, № 2. С. 186.
- Ключко З.Ф., Матов А.Ю., Северов И.Г. 2006. К фауне совок (*Lepidoptera*: *Noctuidae* s.l.) Луганской области (Украина) // Эверсманния. Вып. 5. С. 24-35.

- Ключко З.Ф., Плющ И.Г., Шешурак П.Н. 2001. Аннотированный каталог совок (Noctuidae) фауны Украины. Киев. 882 с.
- Ключко З.Ф., Шешурак П.Н. 2002. Новые данные о видовом составе и распространении совок (Lepidoptera, Noctuidae) в Украине // Вестн. зоол. Т. 36, № 2. С. 22.
- Ключко З.Ф., Шешурак П.Н. 2005. Краткий обзор фауны совок (Lepidoptera, Noctuidae) Луганской области Украины // Біорізноманітність Луганськ. природ. заповідника НАН України. Зб. наук. праць Луганськ. Нац. аграр. Ун-ту. № 56 (79). С. 148-171.
- Медведев С.И. 1950. Материалы к экологическому анализу фауны насекомых искусственных насаждений Велико-Анадольского леса // Тр. НИИ биол. Харьков. гос. Ун-та им. А.М.Горького. Т.14-15. С. 33- 45. (Уч. записки ХГУ. Т. XXXIII).
- Медведев С.И. 1953. Некоторые черты фауны насекомых искусственных насаждений в степях Восточной Украины// Тр. НИИ биол. Харьков.гос. ун-та им. А.М.Горького.Т. 18. С. 63-112. (Уч. записки ХГУ. Т.XLVIII).
- Полтавский А.Н., Артохин К.С., Шмараева А.Н. 2005.Энтомологические рефугиумы в ландшафтных системах земледелия. Ростов на-Дону. 212 с.
- Розанов А.Г. 1928-1929. До лепідоптерофауни Артемівщини (Macrolepidoptera) // Зап. Миколаїв. Ін-ту народної освіти. Т.II. Миколаїв. С. 99-104.
- Червона книга України. 1994.Тваринний світ. Київ: Укр. енциклопедія. 464 с.
- Alberti B., Soffner J. 1962. Zur Kenntnis der Lepidopteren-Fauna Süd und Südostrusslands // Mitt. München entomol. Ges. Bd. 52. S. 146-198.
- Fibiger M. 1990. Noctuidae Europaeae. Vol. 1. Noctuinae I. Sorø: Entomol. Press. 208 p.
- Kljutschko S.F. 1970. Beitrag zur Kenntnis der Noctuidenfauna der Naturschutzsteppen Streletskaia und Chomutovskaja (Ukrainische SSR) (Lepidoptera, Noctuidae) // Entomol. Berichte. Berlin. S.37-48.
- Kljutschko Z., Hacker H. 1996. Die Verbreitung der Arten der Gattung *Hadena* Schrank, 1802 und verwandter Genera in Osteuropa (Lepidoptera, Noctuidae, Hadeninae) // Esperiana. Bd.5. S.697-720.
- Poltavsky A.N., Nekrasov A.V. 2002. The Noctuid Moths of the South of Russia and the Northern Caucasus (Lepidoptera) // Ibid. Bd.9. P.21-47.
- Poltavsky A.N., Matov A.Yu., Silkin Yu.A. 2007. Records of some rare moths (Lepidoptera) in the Rostov-on-Don area (Russia) in 2006 // Phegea. Vol.35 (4). P. 135-140.
- Ronkay L., Yela J.L., Hreblay M. 2001. Noctuidae Europaeae. Hadeninae II. Vol. 5. Sorø: Entomol. Press. 452 p.
- Warnecke G. 1943. Großschmetterlinge aus dem mittleren Donezgebiet 1942 // Z. Wien. Entomol. Ges. Vol. 28. P. 115-118.

Поступила в редакцию 4.02.2008

РЕЗЮМЕ. На основании обобщения многолетних сборов и литературных сведений представлен список 398 видов совок семейств Nolidae, Erebidae, Noctuidae на территории Донецкой области Украины. Впервые для области приведены 28 видов. Списки совок включают: для заповедника «Хомутовская Степь» — 231, для заповедника «Каменные Могилы» — 230, для заказника «Великоанадольский Лес» — 160 видов. Библ. 36.